

*Comacris* Bolívar I., 1890a, p. 312

Espèce-type : *Comacris sansibaricus* Bolívar I., 1890a (= *C. semicarinata*), par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical comprenant deux espèces : *C. lamottei*, la seule dans notre zone d'étude, et *C. semicarinata* (Gerstäcker) d'Afrique orientale.

**Clé** Aucune (?)

### ***Comacris lamottei* Chopard, 1947**

*Comacris lamottei* Chopard, 1947, p. 153

Holotype mâle, Guinée, mont Nimba, MNHN Paris

#### **Citations bibliographiques**

*Comacris lamottei*

- Chopard, 1947, p. 153 ~ 1958a, p. 150
- Dirsh, 1963b, p. 217 ~ 1965, p. 442, 443
- Johnston, 1956, p. 623 ~ 1968, p. 311
- Lamotte & Roy, 1998, p. 121

*Comacris lamottei* (suite)

- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 ~ 2006, p. 106, 1 carte
- Otte, 1995b, p. 272-273
- Roy, 1964a, p. 1175 ~ 2003, p. 365, 381, 388, fig. 24

#### **Distribution géographique**

**Guinée** (Chopard, 1947, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 2003)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

#### **Iconographie**

**Habitus** (im.: Roy, 2003, ♀) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

#### **Bio-écologie**

Roy (2003) a récapitulé les quelques éléments disponibles (Mont Nimba).

L'espèce, dont la femelle est brachyptère, est observée dans les prairies d'altitude (1000 à 1600 m). La

tréantaine d'imagos collectés l'a été de septembre à mars et les deux seuls juvéniles en mars.

