

Cylindrotiltus Ramme, 1929, p. 319Espèce-type : *Cylindrotiltus versicolor* Ramme, 1929, par désignation originale et monotypie

Il s'agit d'un genre monospécifique limité à l'Afrique centrale. Dirsh (1952, p. 267) avait mis ce genre en synonymie avec *Genditia* I. Bolívar (= *Digentia* Stål), mais Hollis (1975, p. 224, 225) l'a réinstitué valide.


Cylindrotiltus versicolor inversus* Ramme, 1929Cylindrotiltus versicolor inversus* Ramme, 1929, p. 321.

Holotype mâle, Cameroun, Ossidinge, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 2 paratypes).

Le statut de cette sous-espèce, citée uniquement par le matériel type du Cameroun provenant de la même zone que la sous-espèce nominative, est à préciser, comme pour beaucoup de sous-espèces décrites par Ramme.

Citations bibliographiques

Cylindrotiltus versicolor inversus (- a)
 -- Otte, 1995a, p. 129 (- a)
 -- Ramme, 1929, p. 321
Genditia versicolor inversa
 -- Johnston, 1956, p. 254

**Distribution géographique****Cameroun** (Ramme, 1929)**Iconographie****Habitus** (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)**Bio-écologie**

Aucune information.

Cylindrotiltus versicolor versicolor* Ramme, 1929Cylindrotiltus versicolor* Ramme, 1929, p. 320, figs. 37-38, pl. 6 : f. 24, 25.

Holotype mâle, Cameroun, Bamenda, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 16 paratypes).

Citations bibliographiques

<p><i>Cylindrotiltus versicolor</i> -- Hollis, 1975, 196, 215, 225, figs. 2, 60 (comb. rev.) -- Medler, 1980, p. 39 -- Ramme, 1929, p. 319, 320, figs. 37-38, pl. 6 : f. 24, 25 <i>Cylindrotiltus versicolor versicolor</i> -- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 18, 115 -- Otte, 1995a, p. 129</p>	<p><i>Genditia versicolor</i> -- Dirsh, 1952, p. 267, 268 ~ 1956c, p. 276, pl. 38 : f. 16 ~ 1965, p. 237, fig. 181c -- Johnston, 1956, p. 254 ~ 1968, p. 174 <i>Pterotiltus versicolor</i> -- Golding, 1948, p. 554</p>
---	---


Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1952, 1965 • Golding, 1948 • Hollis, 1975 • Ramme, 1929) -
 ? **Nigeria** (Medler, 1980)

Hormis la signalisation sans précision de Medler, cette espèce n'a été signalée jusqu'ici que du Cameroun.

Les spécimens signalés du Nigeria par Golding (1948) proviennent en effet tous de Bamenda, localité type du Cameroun proche de la frontière nigérienne actuelle et à l'époque sous tutelle britannique.

Les signalisations du Nigeria de Dirsh (1952) correspondent à du matériel de Golding, a priori celui que cet auteur avait cité car la date de collecte est identique, mais Dirsh indique la localité de Gobiri (non trouvée) ; c'est très certainement la même chose pour Dirsh (1965). Nous rapportons donc ces signalisations au Nigeria ; il est cependant très probable que l'espèce soit présente dans la partie montagneuse frontalière avec le Cameroun.

**Iconographie****Habitus** (im.: Ramme, 1929, ♂♀) - **Autres morph.** (Hollis, 1975 • Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965 • Hollis, 1975)**Bio-écologie**

Aucune information.