

Oedaleus (Gastrimargus) Saussure, 1884, p. 109 (clé), 110-111
 Espèce-type : *Gryllus virescens* Thunberg, 1815 (= *G. marmoratus* Thunberg),
 par désignation subséquente de Kirby (1910, p. 226)


De nombreuses espèces de *Gastrimargus* avaient été décrites, en particulier par Sjöstedt (1928), et la situation est restée longtemps confuse.

La révision de Ritchie (1982) a conduit à admettre une vingtaine d'espèces afrotropicales, orientales et australiennes. Trois espèces sont présentes en Afrique de l'Ouest : *G. africanus africanus*, *G. determinatus procerus* et *G. ochraceus*.

Clé Dirsh (1970, 7 espèces Zaïre) - Ritchie 1982 (23 espèces dont 15 afrotropicales; mais aussi 4 sous-espèces de *G. africanus* et 4 sous-espèces de *G. determinatus*)

Gastrimargus africanus africanus (Saussure, 1888)

Oedaleus (Gastrimargus) marmoratus var. *africana* Saussure, 1888, p. 39
 Syntypes mâle(s), femelle(s), Africa merid. Lectotype mâle, MHN Genève, désigné par Ritchie (1982) et listé par Hollier (2012b), mais Dirsh (1970, p. 491) signalait déjà un lectotype d'Afrique du Sud.



Gastrimargus africanus africanus femelle, d'après Mestre (1988)

Syn. *Gastrimargus africanus* var. *zebrata* Sjöstedt 1928, p. 41, pl. 8 : f. 3-5. Holotype femelle, Tanzanie, NR Stockholm
 [Dirsh, 1966, p. 426, avec *Gastrimargus africanus*]
Gastrimargus africanus var. *orientalis* Sjöstedt, 1928, p. 41, pl. 8 : f. 6-7. Holotype femelle, Sri Lanka, MHN Genève
 [Ritchie, 1982, p. 248, avec *Gastrimargus africanus africanus*]

Citations bibliographiques

- Gastrimargus africanus*
- Chapman, 1961b, p. 274 ~ 1962, p. 14, 40-41, 61 ~ 1964, p. 121 ~ 1988, p. 324
 - Chapman & Roberston, 1958, p. 96-97, 106, fig. 14
 - Chopard, 1958a, p. 143
 - COPR, 1982, p. 442-444, fig. 93, carte 151
 - Cornes & Riley, 1972, p. 13
 - Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182
 - Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
 - Davey, 1959, p. 127
 - Davey *et al.*, 1959b, p. 581-582
 - Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987
 - Delarze & Le Gall, 1989, p. 279
 - Descamps, 1953, p. 597-598, 604, 607 ~ 1954, p. 178 ~ 1962b, p. 198, 201, 210 ~ 1965b, p. 1260, 1282-1284, 1310 ~ 1967b, p. 656 ~ 1968, p. 561, 573
 - Descamps & Le Breton, 1973, p. 124
 - Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 58 ~ 1963b, p. 218 ~ 1964, p. 74 ~ 1965, p. 481, 482, figs. 389a-b ~ 1966, p. 426-427, fig. 218 ~ 1970, p. 489 (clé), 490-492, fig. 150
 - Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164
 - Duranton *et al.*, 1982, nb. pages, figs. 17, 23 (? ou espèce suivante), 158, 442, 946 ~ 1987, p. 183, 246, pl. 3 : f. 63, pl. 63 : f. 1-4
 - Fishpool & Popov, 1984, p. 364
 - Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1973a, nb. pages dont 69-70 ~ 1974a, p.

- Gastrimargus africanus* (suite)
- 157-158, 169-173 ~ 1974b, p. 502-503, 524 (clé) ~ 1983, p. 297, 301-302
 - Golding, 1934a, p. 287 ~ 1948, p. 543-544, 578-584
 - Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b (clé), p. 254 ~ 1968, p. 302-303
 - Jerath, 1968, p. 27-38
 - Johnsen, 1970, p. 156 ~ 1981b, p. 155
 - Johnston, 1956, p. 563-564 ~ 1968, p. 339-340
 - Joyce, nb. pages dont p. 51, fig. 13
 - Kirby, 1910, p. 227
 - Launois, 1978b, p. 212-213, figs. 1-4
 - Launois-Luong & Launois, 1987, p. 183, 246, pl. 3 : f. 63, pl. 63 ; f. 1-4
 - Launois-Luong, 1978a, p. 582 ~ 1980b, p. 774-814
 - Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 643-646, 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 571, 575 ~ 1984 ~ 1988, p. 70-71, 116, figs. non numérotées
 - Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62
 - Mallamaire, 1948, p. 631-632
 - Medller, 1980, p. 39
 - Nzekwu, 1994, p. 150-151, 156
 - Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 85, 92 ~ 1977 ~ 1978
 - Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 340 ~ 1971
 - Popov, 1989, p. 118-119, 3 figs. non numérotées

- Gastrimargus africanus* (suite)
- Popov *et al.*, 1990, p. 110-111, pl. 24
 - Roy, 1962, p. 111, 130 ~ 1969a, p. 218 ~ 1969b, p. 55 ~ 1970, p. 701
 - Sjöstedt, 1928, p. 39-41, 50, pl. 8, f. 1-2, 2a-b
 - Uvarov, 1926a, p. 436 ~ 1966, p. 255, 287, 370, 375, 416 ~ 1977, p. 223, 257, 367, 375, 399, 131, fig. 236

Gastrimargus africanus africanus

 - Baccetti, 2004, p. 32
 - Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331
 - Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 88-89, 1 carte
 - Mestre, 1988, p. 234, 235, figs. 6-10, 1 carte
 - Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~ 2006, p. 22, 143-144, 1 carte
 - Mestre *et al.*, 2001, p. 322
 - Otte, 1995b, p. 358
 - Ritchie, 1982, p. 248-250, 313, 323, figs. 1-2, 4-5, 116 (carte), 121
 - Roy, 2003, p. 372, 381, 388

Gastrimargus marmoratus (Err. dét., espèce asiatique)

 - Dirsh, 1965, p. 481, 482
 - Johnston, 1956, p. 568
 - Karny, 1915, p. 136 (non Thunberg, err. dét. = *G. africanus* selon Sjöstedt, 1928, p. 39)

Oedaleus marmoratus (Err. dét., espèce asiatique)


 - Karsch, 1893, p. 79

Gastrimargus marmoratus Thunberg, décrite à l'origine d'Afrique du sud suite à une erreur de localité (Ritchie, 1982), a été citée de Guinée et du Togo, ainsi qu'à tort de la Sierra Leone (Johnston, 1956, repris par

Dirsh). C'est en fait est une espèce orientale et non afrotropicale. Elle a un aspect et une coloration alaire très proches de *Gastrimargus africanus africanus*.

Distribution géographique

Bénin (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre et al., 2001 • Sjöstedt, 1928 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh et al., 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • mat. exam.) - **Cameroun** (COPR, 1982 • Descamps, 1953, 1954 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982 • Sjöestedt, 1928 • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004 • COPR, 1982 • Couturier et al., 1984 • Delarze & Jungclaes-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1973a, 1974a,b, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982 • Roy, 1969b • mat. exam.) - "French Sudan" (Golding, 1948) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre et al., 2001 • Phipps, 1971 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928 • mat. exam.) - **Guinée** (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Johnsen, 1970 • Karna, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 2003) - **Liberia** (COPR, 1982 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey et al., 1959b • Descamps, 1962b, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1971 • Popov et al., 1990 • Ritchie, 1982 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Popov et al., 1990 • Ritchie, 1982 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1968 • Jerath, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Nzekwu, 1994 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928 • Uvarov, 1926a) - **R. centrafricaine** (COPR, 1982 • Ritchie, 1982) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1970 • mat. exam.) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Ritchie, 1982 • mat. exam.) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982 • mat. exam.) - **Togo** (COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre et al., 2001 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928 • mat. exam.) - **AO** (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1967, 1970 • Duranton et al., 1982, 1987 • Gillon, 1983 • Jago, 1964a, 1968 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1989 • Popov et al., 1990)



D'après Ritchie (1982), la sous-espèce d'Afrique subsaharienne, commune et signalée de la plupart des pays, est *G. africanus africanus* et donc toutes les identifications ouest-africaines s'y rapportent.

A Madagascar, il s'agit de la sous-espèce *G. africanus madagascariensis* que Dirsh (1963a, 1966) ne retenait pas valide contrairement à Ritchie.

Iconographie

Habitus (juv.: Popov, 1989 ✱ im.: COPR, 1982 ♀ • Dirsh, 1965, 1966, 1970, ♂ • Duranton et al., 1982 ♀, 1987 ♂♀ • Joyce, 1952 ♀ • Launois, 1978b ♂♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 ♂♀ • Lecoq, 1988 ♀♂ • Mestre, 1988 ♀ • Popov et al., 1990 ♀ • Ritchie, 1982 ♂ • Rowell, 1970 ♂♀ • Sjöstedt, 1928 ♂♀ • Uvarov, 1977 ♂) - **Autres morph.** (juv. : Popov, 1989 ✱ im. : Duranton et al., 1987 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Lecoq, 1988 • Mestre, 1988 • Sjöstedt, 1928, sous *G. africanus* var. *zebrata*) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1965, 1970 • Ritchie, 1982) - **Ooth.** (Chapman & Roberston, 1958 • Popov et al., 1990)


Bio-écologie

Espèce savanicole assez fréquente sans jamais être abondante.

Gastrimargus determinatus procerus (Gerstäcker, 1889)

Oedaleus (Humbella) procerus Gerstäcker, 1889, p. 48

Type femelle, Ghana, Aburi, perdu selon Dirsh (1961a, p. 318). Néotype mâle, Ghana, Nungua (Accra plain), NHM Londres, désigné par Ritchie (1982, p. 282). Cependant Dirsh (1970, p. 496), sans faire une désignation, cite un néotype femelle du Ghana au NHM.



Gastrimargus determinatus procerus femelle, d'après Mestre (1988)


- Syn.** *Gastrimargus volkensi nigericus* Uvarov, 1926a, p. 437. Holotype mâle, Nigeria, NHM Londres
[Dirsh, 1961a, p. 318, avec *Gastrimargus procerus*]
Gastrimargus amplus Sjöstedt, 1928, p. 16, 48, pl. 1 : f. 1-2. Holotype femelle, Sierra Leone, NR Stockholm
[Dirsh, 1970, p. 496, avec *Gastrimargus procerus*]
Gastrimargus silvicola Sjöstedt, 1928, p. 17, 48, pl. 1 : f. 4. Syntypes mâle(s), femelle(s) (holotype mâle selon Ritchie), Zaïre, NR Stockholm
[Dirsh, 1970, p. 496, avec *Gastrimargus procerus*]
Gastrimargus vittatus Sjöstedt, 1928, p. 18, 48, pl. 2 : f. 3, 3a, 3b. Syntypes mâles (holotype selon Ritchie), Zaïre, NR Stockholm
[Ritchie, 1982, p. 282, avec *Gastrimargus determinatus procerus*]
Gastrimargus foveolorum Sjöstedt, 1928, p. 19-20, 48, pl. 2, f. 1, 1a-c, 2. Holotype femelle, Cameroun, MNHU Berlin (DORSA : + paratype femelle)
[Dirsh, 1970, p. 496, avec *Gastrimargus procerus*]
Gastrimargus foveolorum var. *immaculata* Sjöstedt, 1928, p. 20. Holotype femelle, Zaïre, MRAC Tervuren
[Dirsh, 1970, p. 496, avec *Gastrimargus procerus*]
Gastrimargus testaceus Sjöstedt, 1928, p. 20, 48, pl. 1 : f. 5. Syntypes mâles (holotype selon Ritchie), Cameroun, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes dont 1 "typus")
[Ritchie, 1982, p. 282, avec *Gastrimargus determinatus procerus*]

Citations bibliographiques

<i>Gastrimargus acutangulus</i> (partie, err. dét. voir plus loin <i>Oedaleus</i>)	<i>Gastrimargus foveolorum</i>	<i>Gastrimargus testaceus</i>
-- Dirsh, 1965, p. 481, 482 (partie) ~ 1966, p. 426 Les signalisations de Dirsh renvoient manifestement (pays cités) à Saussure (1988)	-- Dirsh, 1965, p. 481, 482 -- Johnston, 1956, p. 567 -- Sjöstedt, 1928, p. 19-20, 48, pl. 2 : f. 1, 1a-c, 2	-- Dirsh, 1965, p. 481, 482 -- Johnston, 1956, p. 569 -- Sjöstedt, 1928, p. 20, 48, pl. 1 : f. 5
<i>Gastrimargus africanus</i> (Err. dét. Selon Ritchie, 1988)	<i>Gastrimargus nigericus</i>	<i>Gastrimargus vittatus</i>
-- Rowell, 1970, p. 1-48, pl. 1	-- Chapman, 1961b, p. 274, 277, fig. 16 ~ 1962, p. 14, 41, 61 ~ 1964, p. 121	-- Dirsh, 1965, p. 481, 482 ~ 1966, p. 428-429 ~ 1970, p. 489 (clé), 494-495
<i>Gastrimargus amplus</i>	-- Davey, 1959, p. 127 -- Davey et al., 1959b, p. 582 -- Descamps, 1953, p. 597, 604, 607 ~ 1961b, p. 187-199 ~ 1962a, p. 198, 210 ~ 1965b, p. 1260	<i>Gastrimargus volkensi</i>
-- Chopard, 1958a, p. 143 -- Cornes & Riley, 1972, p. 13 -- Davey et al., 1959b, p. 582 -- Descamps, 1965b, p. 1260, 1284 -- Dirsh, 1963b, p. 219 ~ 1965, p. 481, 482 -- Gillon, 1974b, p. 520 -- Jago, 1968, p. 304 -- Johnston, 1956, p. 565 ~ 1968, p. 340 -- Medler, 1980, p. 39 -- Oyidi, 1975b, p. 95 ~ 1977 ~ 1978, p. 5, 11 -- Sjöstedt, 1928, p. 16, 48, pl. 1 : f. 1-2, 2a, 2b	-- Descamps & Mezzadri, 1965, p. 24 -- Golding, 1948, p. 544-545 -- Jago, 1967b (clé), p. 254 ~ 1968, p. 303-304 -- Johnston, 1956, p. 569 -- Medler, 1980, p. 39 -- Phipps, 1962, p. 13-21 -- Sjöstedt, 1928, p. 17	-- Jago, 1968, p. 304 -- Johnston, 1956, p. 571
<i>Gastrimargus determinatus</i>	-- Dahdouh et al., 1978, p. 476-477 -- Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 -- Dirsh, 1961a, p. 318 ~ 1964, p. 74 ~ 1965, p. 481, 482 ~ 1968, p. 494-496, fig. 47 ~ 1970, p. 496-497	<i>Gastrimargus volkensi nigericus</i>
-- Dirsh, 1965, p. 481, 482 -- Johnston, 1956, p. 567 -- Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62	-- Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 -- Duranton et al., 1982, p. 66, 316, 938, 944, figs. 23 (?), 440, 444 -- Fishpool & Popov, 1984, p. 365 -- Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1973a, p. 70, 108, 199, 261, 303, fig. 25 ~ 1974a, p. 158, 172 ~ 1974b, p. 502-503, 524 (clé), fig. 57 -- Johnsen, 1981b, p. 155-156 -- Johnston, 1968, p. 341 -- Launois, 1978b, p. 214-215, figs. 1-4	-- Uvarov, 1926a, p. 437
<i>Gastrimargus determinatus procerus</i>	-- Dahdouh et al., 1978, p. 476-477 -- Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 -- Duranton et al., 1987, p. 183, 245, pl. 3 : f. 62, pl. 62 : f. 1-4 -- Launois-Luong & Launois, 1987, p. 183, 245, pl. 3 : f. 62, pl. 62 ; f. 1-4 -- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 89-90, 1 fig., 1 carte -- Mestre, 1988, p. 236, 237, figs. 1-5, 1 carte -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~ 2006, p. 22, 144-146, 1 carte -- Mestre et al., 2001, p. 322 -- Otte, 1995b, p. 360-361 -- Popov, 1989, p. 118-119, 1 fig. non numérotée -- Popov et al., 1990, p. 112-113, pl. 25 -- Ritchie, 1982, p. 243-244 (clé), 280, 281-283, 312, 325, figs. 57, 59, 60-61, 115 (carte), 137 -- Roy, 2003, p. 372-373, 381, 389, fig. 27	-- Walker, 1871, p. 72-73
<i>Gastrimargus silvicola</i>	-- Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 645-649, 666 ~ 1978b, p. 241-258 ~ 1980b, p. 571, 575-576 ~ 1984 -- Medler, 1980, p. 39 -- Phipps, 1970, p. 340-341 -- Roy, 1969b, p. 55	<i>Pachytalus determinatus</i> var. <i>vitripennis</i> . Ici erreur pour <i>G. d. procerus</i>
	-- Sjöstedt, 1928, p. 17-18, 48, pl. 1 : f. 4, 4a-b	-- Saussure, 1888, p. 39
		<i>Oedaleus (Gastrimargus) acutangulus</i> (non Stål, err. dét. Saussure, 1988, pour <i>Gastrimargus volkensi</i> selon Sjöstedt, 1928, p. 43 = <i>G. determinatus vitripennis</i> . Ici erreur pour <i>G. d. procerus</i>)
		-- Bolívar, 1893b, p. 175 (citation de Saussure)
		<i>Oedaleus (Gastrimargus) volkensi</i>
		-- Gerstäcker, 1889, p. 48
		<i>Pachytalus (Oedaleus) marmoratus</i> var. <i>amplus</i> selon Sjöstedt, 1928, p. 34)
		-- Stål, 1873b, p. 124

Distribution géographique

Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • mat. exam.) - **Cameroun** (Descamps, 1953 • Dirsh, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928) - **Côte d'Ivoire** (Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1970 • Gillon, 1971, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ritchie, 1982 • Roy, 1969b • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1965, 1970 • Gerstäcker, 1889 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saussure, 1888 • Sjöstedt, 1928 • Ritchie, 1982 • Uvarov, 1926a) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 2003 • mat. exam.) - **Liberia** (Dirsh, 1970 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1961b, 1962a, 1965b • Descamps & Mezzadri, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Popov *et al.*, 1990 • mat. exam.) - **Nigeria** (Chopard, 1958a • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1959c, 1961a, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Oyidi, 1975b, 1977, 1978 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928 • Uvarov, 1926a) - **R. centrafricaine** (Sjöstedt, 1928) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965, 1970 (?) • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928) - **Sierra Leone** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Phipps, 1962, 1970 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928 • Stål, 1873b • Uvarov, 1926a • Walker, 1871 • mat. exam.) - **Tchad** (Golding, 1948 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Sjöstedt, 1928 • mat. exam.) - **Togo** (Dirsh, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (Duranton *et al.*, 1982, 1987 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990)




Cette espèce est également signalée vers l'est jusqu'en Éthiopie, et, vers le sud, jusqu'en Angola et Zambie.

Iconographie

Habitus (juv.: Dirsh, 1959c, sous *G. nigericus*, 1968 sous *G. procerus* • Duranton *et al.*, 1982 • Gillon, 1974b • Rowell, 1970, sous *G. africanus* ♂ im.: Dirsh, 1959c ♂ sous *G. nigericus* • Duranton *et al.*, 1987 ♂♀ • Launois, 1978b ♂♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 ♂♀ • Launois-Luong & Lecoq, 1989 ♀ • Mestre, 1988 ♀ • Popov *et al.*, 1990 ♀ • Ritchie, 1982 ♂ • Sjöstedt, 1928 ♂♀ sous *G. amplus*, ♀ sous *G. foveolorum* et *G. silvicola*, ♂ sous *G. testaceus* et *G. vittatus*) - **Autres morph.** (juv. : Popov, 1989 ✱ im. : Dirsh, 1959c sous *G. nigericus* • Duranton *et al.*, 1987 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 ♂♀ • Mestre, 1988 • Sjöstedt, 1928, sous *G. amplus*, *G. silvicola* et *G. vittatus*) - **Anat.** (génit. ♂: Ritchie, 1982) - **Ooth.** (Chapman, 1961b • Dirsh, 1959c, sous *G. nigericus* • Popov *et al.*, 1990)

Bio-écologie**Gastrimargus ochraceus** Sjöstedt, 1928

Gastrimargus ochraceus Sjöstedt, 1928, p. 47, 51, pl. 11 : f. 7, 7a, 7b
Holotype femelle, Gold Coast (= Ghana), N. Territories, Savkwalla, NHM Londres



Gastrimargus ochraceus femelle, d'après Mestre (1988)


Citations bibliographiques

- Gastrimargus ochraceus*
-- Dirsh, 1965, p. 481, 482
-- Gillon, 1971, p. 433, 442, 447, 462,
470 ~ 1973a, p. 71, 124, 134, 141,
261 ~ 1974a, p. 158-159, fig. 25 ~
1974b, p. 503-504, 529 (clé), fig. 58
-- Jago, 1968, p. 304
-- Johnston, 1956, p. 569
-- Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62
-- Mestre, 1988, p. 236, 237, figs. 6-9,
1 carte

- Gastrimargus ochraceus* (suite)
-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~
2006, p. 22, 146, 1 carte
-- Otte, 1995b, p. 363
-- Ritchie, 1982, p. 243-244 (clé), 301-
303, 308, 328, figs. 98-101, 111
(carte), 150
-- Sjöstedt, 1928, p. 47, 51, pl. 11 : f. 7,
7a-b

Distribution géographique

Côte d'Ivoire (Gillon, 1971, 1973a, 1974a, 1974b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982 • mat. exam.) - **Ghana** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ritchie, 1982 • Sjöstedt, 1928)



Curieusement, la seule autre signalisation de cette espèce est du Zaïre.

Iconographie

Habitus (juv.: Gillon, 1974b ♂ im.: Gillon, 1974a ♂ • Mestre, 1988 ♀ • Ritchie, 1982 ♂ • Sjöstedt, 1928 ♀) - **Autres morph.** (Mestre, 1988 • Sjöstedt, 1928) - **Anat.** (génit. ♂: Ritchie, 1982)

Bio-écologie

Cette espèce a été très peu signalée et les seules données précises proviennent de Gillon (1973a, 1974a) en moyenne Côte d'Ivoire (Lamto).

Les juvéniles de cette espèce de savanes, toujours rares, sont observés tout au long de l'année et les

imagos de novembre à mai. Ainsi que l'indique Gillon, on pourrait penser à un cycle annuel mais les données sont insuffisantes pour en être certain. Elle est essentiellement observée en savanes brûlées annuellement.