

Glauningia Ramme, 1929, p. 333-334Espèce-type : *Glauningia macrocephala* Ramme, 1929, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

Glauningia macrocephala* Ramme, 1929Glauningia macrocephala* Ramme, 1929, p. 333, 334-335, figs. 50, 51a, pl. 7 : f. 13.

Holotype femelle, Cameroun, Ossidinge, MNHU Berlin (DORSA : holotype ; 1 paratype indiqué par Ramme au NHM Londres).

Citations bibliographiques*Glauningia*

-- Jago, 1964a, p. 202

Glauningia macrocephala

-- Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 50 : f. 16 ~

1965, p. 205, 206, fig. 153a,b

-- Golding, 1948, p. 577

-- Jago, 1967b, p. 263 (clé) ~ 1968, p.

234

-- Johnston, 1956, p. 235 ~ 1968, p.

151, 152

Glauningia macrocephala

-- Medler, 1980, p. 39

-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 ~

2006, p. 18, 148

-- Otte, 1995a, p. 91


-- Ramme, 1929, p. 333, 334-335, figs.

50, 51a, pl. 7 : f. 13.

Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • Jago, 1964a, 1968 • Ramme, 1929) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Nigeria** (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1964a, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

**Iconographie****Habitus** (im.: Dirsh, 1965, ♂ • Ramme, 1929, ♀) - **Autres morph.** (Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965)**Bio-écologie**

C'est une espèce de la zone forestière, connue uniquement par quelques très rares spécimens, et il n'y a aucune information précise.

Jago (1968), qui l'a trouvé au Ghana dans une ravine en forêt humide, indique "Feeds on broad-leaved forest herbs along streams, e.g. *Fromomum*".