

Hintzia Ramme, 1929, p. 357-358Espèce-type : *Hintzia squamiptera* Ramme, 1929, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

Il a été très souvent orthographié à tort *Hinzia* (voir Dirsh, Otte), apparemment à la suite de Johnston (1956). Il avait été mis en synonymie avec *Parepistaurus* Karsch par Dirsh (1958c) mais Green (1998) l'a réinstitué valide.***Hintzia squamiptera* Ramme, 1929***Hintzia squamiptera* Ramme, 1929, p. 357-358, fig. 63, pl. 8 : f. 11.

Holotype femelle, Cameroun, Buea, MNHU Berlin (DORSA : holotype).

Citations bibliographiques*Hintzia squamiptera*


- Chopard, 1945, p. 177
- Green, 1998, p. 265, 304, 307, 313, 326-328, figs. 155-158, 176, 188, 190-191, 193
- Johnston, 1956, p. 275 (*Hinzia* !)
- Ramme, 1929, p. 357-358, fig. 63, pl. 8 : f. 11

Parepistaurus squamipterus

- Dirsh, 1958c, p. 55-56 (*Hinzia* ! mis en synonymie) ~ 1965, p. 243, 244
- Jago, 1962, p. 142, 43-144, 147, figs. 10, 13, 33-35
- Johnston, 1968, p. 179
- Otte, 1995a, p. 140

Distribution géographique**Cameroun** (Chopard, 1945 • Green, 1998 • Jago, 1962 • Ramme, 1929)

Espèce signalée uniquement de divers monts de l'ouest du Cameroun (Mont Cameroun, Mont Koupe, Mont N'Lonako)



Hintzia squamiptera

Iconographie**Habitus** (im.: Jago, 1962, ♂ • Ramme, 1929, ♀) - **Autres morph.** (Green, 1998 • Jago, 1962 • Ramme, 1929) - **Anat.** (génit. ♂: Green, 1998 • Jago, 1962)**Bio-écologie**

Cette espèce microptère n'a été recensée que de quelques localités d'altitude (plus de 900-1000 m). Jago (1962) l'observe sur les pentes du Mont Cameroun dans des zones broussailleuses au sol tapissé d'herbes basses.