


Hyperocnocerus Uvarov, 1953b, p. 138
Espèce-type : *Ocnocerus sulculatus* Karsch, 1893, par désignation originale

Genre afrotropical monospécifique.

***Hyperocnocerus sulculatus* (Karsch, 1893)**

Ocnocerus sulculatus Karsch, 1893, p. 63 (clé), 64, fig. 5
Syntypes femelles, Togo, Bismarckurg, MNHU Berlin (DORSA : 3 syntypes femelles)



Hyperocnocerus sulculatus
d'après Karsch (1893)

Syn. *Hyperocnocerus angolensis* Uvarov, 1953, p. 138, 139, figs. 163-165, Holotype mâle, Angola, NHM Londres
[Dirsh, 1970, p. 420-421, avec *H. sulculatus*]

Citations bibliographiques

Hyperocnocerus angolensis
-- Dirsh, 1966, p. 377, fig. 192
-- Uvarov, 1953b, p. 138, 139, figs. 163-165

Hyperocnocerus sulculatus
-- Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 54 : f. 15 ~ 1965, p. 415, 416, fig. 331c ~ 1966, p. 377 ~ 1970, p. 420-421
-- Fishpool & Popov, 1984, p. [399] (section B, non paginée)


Hyperocnocerus sulculatus (suite)
-- Jago, 1967b (clé), p. 251 ~ 1968, p. 316
-- Johnston, 1956, p. 618 ~ 1968, p. 297
-- Mestre, 1988, p. 182, 183, fig. 9
-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 ~ 2006, p. 21, 175, 1 carte
-- Otte, 1995b, p. 284

Hyperocnocerus sulculatus (suite)
-- Uvarov, 1953b, p. 138-139, figs. 160-162
Ocnocerus sulculatus
-- Karsch, 1893, p. 64, fig. 5
-- Kirby, 1910, p. 99

Distribution géographique

Togo (Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Uvarov, 1953b) - **AO** (Mestre, 1988)

Le Togo est le seul pays cité en Afrique occidentale et centrale. Elle est également citée d'Angola, du Zaïre et de Zambie.



Cette espèce fait partie de ce petit nombre d'espèces nouvelles décrites par Karsch, collectées en 1890-1891 à Bismarckburg, et qui n'ont jamais été signalées jusqu'ici en Afrique de l'Ouest d'autres régions écolimatiques comparables, même bien prospectées.

C'est le cas notamment des régions adjacentes du Ghana et, à un degré moindre, du Bénin. Même si l'étendue exacte de leur répartition est à préciser, ceci montre la singularité de cette région.

Iconographie

Habitus (im.: Dirsh, 1966, ♂, sous *H. angolensis* • Karsch, 1893, ♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Uvarov, 1953b, sous *H. ocnocerus* et *H. angolensis*) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1956c)

Bio-écologie

Les seules informations précises proviennent de la description de Karsch avec des imagos collectés de février à avril. Fishpool & Popov (1984), dans leur liste annexe des espèces peu documentées, parlent d'une espèce monovoltine passant la saison sèche sous forme

d'imagos en arrêt reproductif mais il n'y a pas de précision sur les données originales. Ils indiquent avec réserve qu'elle serait associée aux zones de savanes ouvertes, sur les plages de sol nu, de latérite, ... A priori graminivore.