

*Jasomenia* Bolívar I., 1914a, p. 96-97

Espèce-type : *Jamesonia dimidiata* Bolívar I., 1909b (= *J. sansibara* Karsch),  
par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

**Syn.** *Jamesonia* Bolívar I., 1909b, p. 292 (nom. praecoc) [Bolívar I., 1914a, p. 96, avec *Jasomenia*, nom. nov.]

### ***Jasomenia sansibara* (Karsch, 1896)**

*Epacromia sansibara* Karsch, 1896, p. 264-265

Holotype femelle, Africa orientalis, Usáramo (= *Tanzanie*), MNHU Berlin (DORSA : holotype)

**Syn.** *Jamesonia dimidiata* Bolívar I., 1909b, p. 292. Syntypes mâles, Zambie, MRAC Tervuren

[Hollis, 1967, p. 157, avec *Jasomenia sansibara*]

En 1909b, Bolívar, dans une simple note infra-paginale, créé le genre *Jamesonia* pour une nouvelle espèce, *J. dimidiata* du Congo. Mais ce n'est qu'en 1912b (p. 79-80) qu'il l'a décrite, encore comme nouvelle, et a donné les précisions sur le matériel examiné et les localités types.

*Jasomenia cinctipes* Miller, 1932, p. 27, fig. 9. Holotype mâle, Afrique du Sud, NHM Londres

[Hollis, 1967, p. 157, avec *Jasomenia sansibara*]

### **Citations bibliographiques**

*Aeolopus sansibara*

-- Kirby, 1910, p. 192

*Jasomenia cinctipes*

-- Miller, 1932, p. 27, fig. 9

*Jasomenia dimidiata*

-- Descamps, 1968, p. 561, 568

-- Dirsh, 1965, p. 456, 457, fig. 367a-c

~ 1970, p. 472-473, fig. 145

-- Golding, 1948, p. 538

*Jasomenia dimidiata* (suite)

-- Johnston, 1956, p. 512 ~ 1968, p. 319

-- Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 667 ~

1980a, p. 65 (err. dét. = *Paracinema*

*tricolor*) ~ Lecoq, 1980b, p. 572

-- Uvarov, 1953b, p. 108 ~ 1977, p. 436

*Jasomenia sansibara*

-- Baccetti, 1997, p. 85, 102, 103, fig. 305

-- Cornes & Riley, 1972, p. 12

-- Hollis, 1967, p. 157-158

-- Medler, 1980, p. 40

-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~


2006, p. 22, 176, 1 carte

-- Otte, 1995b, p. 347-348

### **Distribution géographique**

**Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1967 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 2006)  
- **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006)

La signalisation du Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1978a, 1980a) est une erreur pour *Paracinema tricolor*, espèce non citée par cet auteur. Cette espèce est citée vers l'est jusqu'en Somalie et, vers le sud, jusqu'en Afrique du Sud.



### **Iconographie**

**Habitus** (im.: Dirsh, 1965, ♂, sous *J. dimidiata* ~ 1970, ♂) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965, sous *J. dimidiata* ~ 1970 • Miller, 1932, sous *J. cinctipes*) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1965, sous *J. cinctipes* ~ 1970) - **Histol.** (Baccetti, 1997, ♂, spermatozoïdes)

### **Bio-écologie**

Aucune information.

Uvarov (1953b, 1977) souligne l'aspect élargi des tibias postérieurs, spécialisés pour la "nage" à l'image d'autres genres hygrophiles comme par exemple *Oxya* ou *Tropidopola*.