

Kassongia Bolívar I., 1908, p. 113Espèce-type : *Kassongia flavovittata* Bolívar I., 1908, par désignation originale et monotypieGenre afrotropical comprenant 6 espèces avec uniquement *K. flavovittata flavovittata* dans notre zone d'étude. Il a été révisé par Grunshaw (1986).**Clé** Grunshaw (1986, ♂ 6 espèces).***Kassongia flavovittata flavovittata* Bolívar, 1908***Kassongia flavovittata* Bolívar I., 1908c, p. 114

Type mâle (holotype selon Grunshaw, 1986), R.D. Congo, Kassongo à Stanleyfalls, IRSN Bruxelles.

Citations bibliographiques*Kassongia flavovittata*

- Bolívar I., 1908c, p. 114
- Dirsh, 1956c, p. 279, pl. 50 : f. 5 ~ 1965, p. 204, 205, fig. 152 ~ 1966, p. 115-116, fig. 48 ~ 1970, p. 99-100, fig. 29
- Johnston, 1956, p. 271
- Kirby, 1910, p. 470
- Ramme, 1929, p. 377, fig. 74, pl. 9 : f. 12

Kassongia flavovittata flavovittata

- Grunshaw, 1986 (stat. nov.), p. 33-38, 41-45, figs. 2, 8, 14, 18-20, 28-30, 38-39 47, 50, 52-53, 65

Distribution géographique**R. centrafricaine** (Grunshaw, 1986)

Cette sous-espèce est également signalée d'Angola (Dirsh, 1966, 1970, pays non repris par Grunshaw), de R.D. Congo (ex-Zaire), d'Ouganda et de Tanzanie.

**Iconographie****Habitus** (im.: Dirsh, 1965, 1966, 1970, ♂, *K. flavovittata*) - **Autres morph.**(Dirsh, 1965, 1966, 1970, *K. flavovittata* • Grunshaw, 1986 • Ramme, 1929, *K. flavovittata*) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1956c, 1965, 1966, 1970, *K. flavovittata* • Grunshaw, 1986)**Bio-écologie**

Aucune information.

Grunshaw (1986) indique dans sa révision du genre que toutes les espèces sont trouvées " in warm sunny clearings and open trails along streams in tropical forests ".