

Madimbania Dirsh, 1953, p. 234

Espèce-type : *Allotriusia madimbana* Giglio-Tos, 1907b, par désignation originale

Genre afrotropical comprenant deux espèces selon Jago (1984).

Syn. *Pyrganthermus* Dirsh, 1953, p. 236-237 [Dirsh, 1966, p. 239, avec *Madimbania*]

Clé Dirsh (1956a, 3 espèces mais pas *M. cephalica* ~ 1966, 1970, 3 espèces dont *M. fumipennis* transféré dans *Anthermus* par Jago, 1984).

Madimbania cephalica (Bolívar, 1889)

Anthermus cephalicus Bolívar, 1889b, p. 157-158.

Type femelle, Angola, Caconda, détruit (incendie Muséum de Lisbonne).

Syn. *Anthermus acutifrons* Miller, 1929, p. 82-83, pl. 11 : f. 63, 64. Holotype mâle, Tanzanie, NHM Londres [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236, avec *Pyrganthermus cephalicus*]
Anthermus uamicus Ramme, 1929, p. 455. Holotype mâle, République centrafricaine, MNHU Berlin (DORSA : holotype + 4 paratypes femelles, mais il semble n'y en avoir qu'un cité dans la publication) [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]
Anthermus longiceps Ramme, 1929, p. 457, fig. 95, pls. 14 : f. 8. Holotype femelle, sans précision. Dirsh (1956a, p. 25, repris par Jago, 1968, p. 267) indique comme localité type La Panda au Katanga (= R.D. Congo, *ex-Zaire*) et l'IRSN Bruxelles comme dépositaire (DORSA : non recensé). [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 237, avec *Pyrganthermus cephalicus*]

Citations bibliographiques

Anthermus acutifrons
 -- Miller, 1929, p. 82-83, pl. 11 : f. 63, 64

Anthermus cephalicus
 -- Kirby, 1910, p. 443

Anthermus longiceps
 -- Ramme, 1929, p. 457, fig. 95, pl. 14 : f. 8

Anthermus uamicus
 -- Ramme, 1929, p. 455

Madimbania cephalica (-us)
 -- Dirsh, 1966 (comb. nov.), p. 241-242, fig. 112 ~ 1970, p. 277-278

Madimbania cephalica (-us)(suite)
 -- Fishpool & Popov, 1984, [p. 395] (section B non paginée)

-- Jago, 1984, p. 358-359, figs. 163-167
 -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 20, 186-187, 1 carte

-- Otte, 1995a, p. 310

Madimbania sp. (?)

-- Medler, 1980, p. 40
 Nous rapportons cette signalisation à *M. cephalica* sous réserves.

Pyrganthermus cephalicus
 -- Chapman, 1962, p. 29

Pyrganthermus cephalicus (suite)
 -- Dirsh, 1956a, p. 25, figs. 30-33 ~ 1956c, p. 275, pl. 34 : f. 7 ~ 1965, p. 348, fig. 273a-d

-- Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 236-237

-- Jago, 1968, p. 267-268

-- Johnston, 1956, p. 335 ~ 1968, p. 244


-- Uvarov, 1953b, p. 34, 35-36, fig. 28

Distribution géographique

Bénin (Fishpool, *comm. pers.* • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1968 ? • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Nigeria** ? (Medler, 1980) - **R. centrafricaine** (Dirsh, 1956a, 1965 • Jago, 1968, 1984 • Ramme, 1929)

L'aire de répartition vers l'est s'étend jusqu'à l'Éthiopie, et vers le sud jusqu'à l'Angola et à la Zambie.

Dirsh et Jago citent le Cameroun mais, faisant référence au matériel type de Ramme (*A. uamicus*), c'est une erreur pour la République centrafricaine. Jago (1968) cite l'espèce dans son inventaire du Ghana mais ne donne aucune localité.



Madimbania cephalica

Iconographie

Habitus (*im.*: Dirsh, 1965 ♂ sous *Pyrganthermus*, 1966 ♂ • Jago, 1984 ♂ • Ramme, 1929 ♀ sous *A. longiceps*) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a, 1965, 1966 • Jago, 1984 • Miller, 1929, sous *A. acutifrons* • Ramme, 1929, sous *A. longiceps* • Uvarov, 1953b) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, sous *Pyrganthermus*, 1956c, 1965 • Jago, 1984)

Bio-écologie

L'espèce n'est signalée dans notre zone d'étude que par de très rares spécimens et il n'y a aucune information.

Madimbania madimbana (Giglio-Tos, 1907)

Allotriusia madimbana Giglio-Tos, 1907b, p. 14-15.

Holotype femelle, R.D. Congo (*ex-Zaire*), Madimba, MRSN Turin.

- Syn.** *Catantops pamae* Ramme, 1929, p. 432-433, fig. 87a, pl. 13 : f. 3, 4. Holotype mâle, République centrafricaine, MNHU Berlin
 [Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Madimbania madimbana*]
Madimbania obesa Uvarov, 1953b, p. 20, 25-26, fig. 11. Holotype mâle, Angola, NHM Londres
 [Dirsh, 1966, p. 240, avec *Madimbania madimbana*]

Citations bibliographiques

Allotriusia madimbana

- Kirby, 1910, p. 444
- Ramme, 1929, p. 431, 483

Catantops madimbanus

- Ramme, 1929, p. 431, pl. 13 : f. 2

Catantops pamae

- Ramme, 1929, p. 432-433, fig. 87a, pl. 13 : f. 3, 4

Madimbania madimbana

- Dirsh, 1953, p. 234, comb. nov. ~ 1956a, p. 21, 23, 24, figs. 17 (carte), 18-23 ~ 1956c, p. 275, pl. 34 : f. 6 ~ 1965, p. 355, 356, fig. 280a-e ~ 1966, p. 240-241, fig. 111 ~ 1970, p. 276-277, fig. 88

Madimbania madimbana (suite)


- Jago, 1984, p. 358-359
 - Johnston, 1956, p. 335-336 ~ 1968, p. 248
 - Otte, 1995a, p. 310-311
- #### *Madimbania obesa*
- Dirsh, 1956a, p. 21, 23, 24, figs. 17 (carte), 27-29

Distribution géographique

R. centrafricaine (Dirsh, 1956a, 1965, 1966, 1970 • Ramme, 1929)

Dirsh cite le Cameroun mais, faisant référence au matériel type de Ramme (*C. pamae*), c'est une erreur.

L'espèce est également citée du Congo, de R.D. Congo (ex-Zaïre), d'Angola et de Zambie.



Iconographie

Habitus (im.: Dirsh, 1965 ♀, 1966 ♂, 1970 ♀ • Ramme, 1929, sous *C. madimbanus* ♀ et sous *C. pamae* ♂♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a sous *M. madimbana* et *M. obesa*, 1965, 1966, 1970 • Uvarov, 1953b sous *M. obesa*) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965, 1970)

Bio-écologie

L'espèce n'est signalée dans notre zone d'étude que par la série type de *C. pamae* et il n'y a aucune information.