

OCHRILIDIA Stål, 1873 - Gomphocerinae

1/8

Ochrilidia Stål, 1873b, p. 104

Espèce-type : *Platypterna gracilis* Krauss, 1902b, par désignation subséquente de Jago (1977, p. 164)

Ce genre comprend plus d'une trentaine d'espèces réparties depuis l'Afrique jusqu'à l'Asie occidentale. Il est demeuré longtemps dans un état de confusion très important, avec de nombreuses espèces décrites de validité douteuse.

Nous reprenons ici les conclusions de la révision de Jago (1977). Soulignons que Mistshenko (1986) a revu de son côté une partie du genre. S'il a confirmé certaines synonymies de Jago, il a par contre retenu comme valides un nombre important d'espèces paléarctiques. Ce genre nécessite à l'évidence d'être réétudié.

Syn. *Platypterna* Fieber, 1853, p. 98 (nom. praeoc) [Uvarov, 1940b, p. 116, avec *Ochrilidia*, nom. subst.]
Martinella Bolívar, 1909b, p. 293 (nom. praeoc) [Salfi, 1928a, p. 192, avec *Platypternella*, nom. subst.]
Platypternella Salfi, 1928a, p. 192 [Dirsh, 1958d, p. 244, avec *Ochrilidia*]
Platypternopsis Chopard, 1947, p. 151 [Dirsh, 1958c, p. 62, avec *Ochrilidia*]

Clé Salfi (1931, *Platypterna*, diverses espèces tombées en synonymie, d'autres absentes) - Jago (1977, 10 espèces)

***Ochrilidia albrechti* Jago, 1977**


Ochrilidia albrechti Jago, 1977, p. 199-200, 211, 212, , 214, 215, 216, figs. 11, 30, 60, 61, 95.

Holotype mâle, Sudan, Gedaref distr., Khor by camp 10, NHM Londres

Citations bibliographiques

Ochrilidia albrechti

- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 336
- Fishpool & Popov, 1984, p. 376
- Jago, 1977, p. 194, 199-200, 211, 212, 214, 215, 216, figs. 11, 30, 60, 61, 95, carte 4
- Lecoq, 1980b, p. 580, 584-586
- Mestre, 1988, p. 288
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 ~ 2006, p. 23, 199, 1 carte
- Otte, 1995b, p. 186



Distribution géographique

Mali (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mauritanie** (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **AO** (Lecoq, 1980b)

L'espèce est également signalée du Soudan.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Jago, 1977) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1977)

Bio-écologie

***Ochrilidia brevipes* Chopard, 1947**

Ochrilidia brevipes Chopard, 1947, p. 150-151

Holotype mâle, Mauritanie, Akjoujt, MNHN Paris

Syn. *Ochrilidia pachypes* Chopard, 1950, p. 138
 [Jago, 1977, p. 203, avec *Ochrilidia brevipes*]

Chopard, pensant son nom *O. brevipes* déjà utilisé par *O. brevipes* Stål l'avait renommé *O. pachypes*, mais l'espèce de Stål avait en fait été transférée dans le genre *Platypernodes* par Bolívar (1908d).

Citations bibliographiques

Ochrilidia brevipes

- Chopard, 1947, p. 150-151
- Fishpool & Popov, 1984, p. 407
- Jago, 1977, p. 203-206, 211, 212, 213, 214, 215, 217, carte 6, figs. 12, 36-37, 62-64, 104
- Lecoq, 1980b, p. 580, 584-586
- Mestre, 1988, p. 266, 267, 288 (clé), fig. 6, 1 carte

Ochrilidia brevipes (suite)

- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 ~ 2006, p. 23, 199-200, 1 carte


Ochrilidia pachypes

- Chopard, 1950, p. 138
- Descamps, 1968, p. 575, 580
- Dirsh, 1965, p. 517-518
- Johnston, 1956, p. 715
- Otte, 1995b, p. 188

Distribution géographique

Mali (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Mauritanie** (Chopard, 1947 • Dirsh, 1965 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Niger** (Chopard, 1950 • Dirsh, 1965 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Hors de notre zone d'étude, l'espèce n'est signalée que des environs de Djibouti et d'Arabie.


**Iconographie**

Habitus (?) - **Autres morph.** (Jago, 1977 • Mestre, 1988) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1977)

Bio-écologie***Ochridia geniculata* (Bolívar, 1913)**

Platypterna geniculata Bolívar, 1913, p. 608

Syntypes mâle, femelle, Algérie, south of El Golea, MNCN Madrid. Lectotype mâle désigné par Jago (1977, p. 177)



Ochridia geniculata femelle et mâle, d'après Mestre (1988)

- Syn.** *Platypterna kraussi* Bolívar, 1913, p. 609, 610 (clé). Type femelle (holotype selon Jago, 1977), Algérie, MNCN Madrid
[Jago, 1977, p. 177, avec *Ochridia geniculata*]
- Platypterna rothschildi* Bolívar, 1913, p. 607-608. Type femelle (holotype selon Jago, 1977, Algérie, MNCN Madrid
[Jago, 1977, p. 177, avec *Ochridia geniculata*]
- Platypterna pictipes* Uvarov, 1922d, p. 725-726. Holotype femelle, Muscat, NHM Londres
[Jago, 1977, p. 177, avec *Ochridia geniculata*]
- Platypterna lybica* Salfi, 1925, p. 289, 292. Syntypes, Afrique du nord, Libye
[Massa, 1998, p. 303, avec *Ochridia geniculata*]
- Platypterna pruinosa agedabiae* Salfi, 1928b, p. 244. Holotype mâle, Algérie, perdu selon Jago (1977)
[Salfi, 1931, p. 293, avec *Platypterna geniculata*]
- Platypterna ladakiae* Salfi, 1931, p. 300-302, figs. 108-111. Holotype femelle, Syrie, NM Vienne
[Jago, 1977, p. 177, avec *Ochridia geniculata*]
- Platypterna nilotica* Salfi, 1931, p. 268 (clé), 307-311, figs. 7, 131-150. Lectotype femelle (Jago, 1977), Soudan, NHM Londres
[Jago, 1977, p. 177, avec *Ochridia geniculata*]
- Platypterna variopicta* Salfi, 1931, p. 268 (clé), 311-313, figs. 7, 151-161. Holotype femelle, Iran, ZI Saint-Pétersbourg
[Jago, 1977, p. 177, avec *Ochridia geniculata*]
- Platypternopsis bivittata* Chopard, 1947, p. 151-152. Holotype femelle, Tchad, MNHN Paris
[Dirsh, 1958c, p. 62, avec *Ochridia kraussi*]
[Jago, 1977, p. 177, avec *Ochridia geniculata*]
- Mistshenko (1986) confirme les synonymies de *P. kraussi*, *P. lakadiae*, *P. nilotica* et *P. rothschildi* avec *O. geniculata*, mais considère que *O. pictipes* et *O. variopicta* sont des espèces valides.

Citations bibliographiques*Ochridia geniculata*

- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 336
- Chopard, 1952, p. 476 ~ 1958c, p. 16
- COPR, 1982, p. 521-523

Ochridia geniculata (suite)

- Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 59, 105, 144, 185, 194, 204
- Descamps, 1968, p. 575, 579-580
- Descamps & Le Breton, 1973, p. 127
- Dirsh, 1965, p. 517-518, fig. 417

Ochridia geniculata (suite)

- Duranton *et al.*, 1982, p. 280, 342, 389, 447, 770, 1210, figs. 128, 158, 358, 571 ~ 1983, p. 197-207, 220-221 ~ 1984, p. 41 ~ 1987, p. 176, 177, 198, pl. I : f. 15, pl. 15 : f. 1-5

Ochrilidia geniculata (suite)

- Fishpool & Popov, 1984, p. 376
 - Jago, 1977, p. 177-185, 311, , 212, 213, , 214, 215, 217, carte 2, figs. 18, 44, 50-51, 67-71, 86-87, 102
 - Johnston, 1956, p. 712 ~ 1968, p. 372
 - Launois, 1978b, p. 39, 45, 264-265, pl. D2 : f. 33, figs. 1-5,
 - Launois-Luong & Launois, 1987, p. 176, 177, 198, pl. I : f. 15, pl. 15 : f. 1-5
 - Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 109
 - Launois *et al.*, 1988, p. 159
 - Lecoq, 1980b, p. 580, 584-586
 - Medler, 1980, p. 40
 - Mestre, 1988, p. 266, 267, 288 (clé), figs. 1-5, 1 carte
- Ochrilidia geniculata* (suite)
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 ~ 2006, p. 23, 200-201, 1 carte
 - Otte, 1995b, p. 187
 - Reynolds & Riley, 1988, p. 255-257, 264, 266-269
- Ochrilidia kraussi*
- Chopard, 1950, p. 138 ~ 1952, p. 476
 - Davey *et al.*, 1959b, p. 590

Ochrilidia kraussi (suite)


- Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 105, 204
 - Descamps, 1965b, p. 1292, 1299, 1310 ~ 1968, p. 575, 580-581
 - Descamps & Le Breton, 1973, p. 127
 - Dirsh, 1965, p. 517-518
 - Johnston, 1956, p. 714 ~ 1968, p. 373
 - Roy, 1964b, p. 1180, 1187, 1195-1196 ~ 1971, p. 409
- Ochrilidia nilotica*
- Davey *et al.*, 1959b, p. 590
 - Descamps, 1965b, p. 1292
 - Dirsh, 1965, p. 517-518
 - Johnston, 1968, p. 373
- Platypternopsis bivittata*
- Chopard, 1947, p. 151-152
- Platypterna geniculata*
- Chopard, 1932, p. 871 ~ 1938, p. 63, fig. 23 ~ 1943c, p. 263 ~ 1963, p. 470
 - Morales Agacino, 1945, p. 324 ~ 1947, p. 262 ~ 1948, p. 16
 - Salfi, 1931, p. 264-265, 267 (clé), 293-298, figs. 7, 46-102
- Platypterna kraussi*
- Chopard, 1943c, p. 264-265 ~ 1952, p. 476 ~ 1963, p. 471

Platypterna kraussi (suite)

- ? Descamps, 1953, p. 604
 - Dirsh, 1965, p. 518
 - Mallamaire, 1948, p. 631
 - Salfi, 1931, p. 264-265, 267 (clé), 298-300-, figs. 7, 103-107
 - Uvarov, 1924a, p. 20, 41, pl. 2 : f. 22-24
- Platypterna lakadiae*
- Salfi, 1931, p. 264-265, 267 (clé), 300-302-, figs. 7, 108-111
- Platypterna lybica*
- Salfi, 1931, p. 264-265, 267 (clé), 290-293-, figs. 7, 67-75
- Platypterna nilotica*
- Salfi, 1931, p. 264-265, 268 (clé), 307-311, figs. 7, 131-150
- Platypterna pictipes*
- Salfi, 1931, p. 264-265, 267 (clé), 303-307, figs. 7, 116-130
- Platypterna rotschildi*
- Salfi, 1931, p. 264-265, 268 (clé), 314-315, figs. 7, 162-164
- Platypterna variopicta*
- Salfi, 1931, p. 264-265, 268 (clé), 311-313, figs. 7, 151-161

Distribution géographique

? **Cameroun** (Descamps, 1953 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Cap-Vert** (Chopard, 1958c • Duranton *et al.*, 1983, 1984 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **"French Sudan"** (Dirsh, 1965) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Reynolds & Riley, 1988 • Roy, 1964b • *mat. exam.*) - **Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • COPR, 1982 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1964b, 1971 • *mat. exam.*) - **Niger** (Chopard, 1943c, 1950, 1952 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1964b • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **"Rio de Oro"** (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Morales Agacino, 1945, 1947, 1948) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1964b) - **Tchad** (Chopard, 1932, 1947, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **AO** (Chopard, 1943c • Dirsh, 1965 • Duranton *et al.*, 1987 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Lecoq, 1980b • Mallamaire, 1948)



La signalisation méridionale de *P. kraussi* au nord du Cameroun, due à Descamps (1953), fait certainement référence à une autre espèce que *O. geniculata*. Il indique en effet que c'est une espèce commune dans les zones inondables du Logone, ce qui ne correspond nullement à la répartition et à l'écologie de cette espèce, sans signaler par ailleurs d'autres espèces du genre.

L'espèce est présente vers l'est jusqu'en Somalie, en Afrique du Nord, Proche-Orient et Arabie, et au-delà jusqu'en Inde.

Iconographie

Habitus (im.: Chopard, 1938 ♀ • Dirsh, 1965 ♂ • Duranton *et al.*, 1987 ♂♀ • Launois, 1978b ♂♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 ♂♀ • Mestre, 1988) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965 • Duranton *et al.*, 1987 • Jago, 1977 • Launois, 1978b • Mestre, 1988 • Salfi, 1931, sous *Platypterna geniculata*, *P. kraussi*, *P. lakadiae*, *P. lybica*, *P. nilotica*, *P. pictipes*, *P. rotschildi* et *P. variopicta* • Uvarov, 1924a, sous *P. kraussi*) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1965 • Jago, 1977)

Bio-écologie

Ochrilidia gracilis gracilis (Krauss, 1902)

Platypterna gracilis Krauss, 1902b, p. 231, 236-237, fig. 2

Type mâle, Algérie, Ghardaïa (holotype indiqué perdu par Jago, 1977, mais holotype mâle au SMN Stuttgart d'après le recensement DORSA).

- Syn.** *Platypterna acuta* Bolívar, 1908d, p. 244-245. Syntypes mâle(s), femelle(s), Iran (holotype femelle perdu selon Jago, 1977)
[Jago, 1977, p. 186, avec *Ochrilidia gracilis gracilis*]
Platypterna curvifrons Bolívar, 1908d, p. 245. Type femelle (holotype selon Jago, 1977), Iran, MNCN Madrid
[Jago, 1977, p. 186, avec *Ochrilidia gracilis gracilis*]
Platypterna aegyptia Uvarov, 1924a, p. 18-20, 41, pl. 2 : f. 19-21. Syntypes femelles (holotype selon Jago, 1977), Égypte, NHM Londres
[Jago, 1977, p. 186, avec *Ochrilidia gracilis gracilis*]
Platypterna obtusa Salfi, 1931, p. 268 (clé), 324-326, figs. 182-186. Holotype femelle, Iran, MNHU Berlin (DORSA : holotype femelle)
[Jago, 1977, p. 186, avec *Ochrilidia gracilis gracilis*]
Platypterna affinis Salfi, 1931, p. 268 (clé), 326-328, figs. 187-192. Holotype femelle, Iran, ZI Saint-Pétersbourg
[Jago, 1977, p. 186, avec *Ochrilidia gracilis gracilis*]
Platypterna uvarovi Salfi, 1931, p. 269 (clé), 342-345, figs. 263-272. Holotype femelle, Arménie, NM Vienne
[Jago, 1977, p. 186, avec *Ochrilidia gracilis gracilis*]
Platypterna aethiopica Salfi, 1931, p. 269 (clé), 328-330, figs. 193-199. Holotype femelle (en fait mâle selon Jago, 1977 et DORSA), Éthiopie, MNHU Berlin (DORSA : + 2 paratypes)
[Jago, 1977, p. 186, avec *Ochrilidia gracilis gracilis*]
Mistshenko (1986) considère comme espèces valides *Ochrilidia acuta* (dont *Platypterna curvifrons*, *P. obtusa*, *P. affinis* et *P. uvarovi* sont synonymes) et *Ochrilidia aethiopica*.

Citations bibliographiques

- | | | |
|---|--|---|
| <i>Ochrilidia aethiopica</i> | <i>Ochrilidia gracilis gracilis</i> | <i>Platypterna aegyptia</i> (suite) |
| -- Descamps, 1968, p. 575, 578-579 | -- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 336 | -- Uvarov, 1924a, p. 18-20, 41, pl. 2 : f. 19-21 |
| <i>Ochrilidia gracilis</i> | -- Dahdouh <i>et al.</i> , 1978, p. 476-477 | <i>Platypterna aethiopica</i> |
| -- Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 | -- Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 269 (clé), 328-330, figs. 7, 193-199 |
| -- Chopard, 1950, p. 137 ~ 1952, p. 476 | -- Fishpool & Popov, 1984, p. 376 | <i>Platypterna affinis</i> |
| -- COPR, 1982, p. 523-524 | -- Jago, 1977, p. 186-191, 211, , 212, 213, 214, 215, 216, carte 3, figs. 14, 32-33, 75, 77-78, 99 | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 268 (clé), 326-328, figs. 7, 187-192 |
| -- Davey <i>et al.</i> , 1959b, p. 590 | -- Launois-Luong & Launois, 1987, p. 176, 177, 200, pl. I : f. 17, pl. 17 : f. 1-5 | <i>Platypterna curvifrons</i> |
| -- Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 204 | -- Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 109-110, 1 fig. non numérotée, 1 carte | -- Bolívar, 1913, p. 610 (clé) |
| -- Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-280 | -- Lecoq, 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 69 ~ 1980b, p. 580, 584-586 ~ 1984 | <i>Platypterna gracilis</i> |
| -- Descamps, 1965b, p. 1292 ~ 1968, p. 575, 580 | -- Mestre, 1988, p. 266, 288 (clé), 1 carte | -- Bolívar, 1905a, p. 1058 ~ 1913, p. 610 (clé) |
| -- Descamps & Le Breton, 1973, p. 127 | -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 ~ 2006, p.23, 201-202, 1 carte | -- Chopard, 1931, p. 628 ~ 1941, p. 47 ~ 1943c, p. 264 ~ 1963, p. 471 |
| -- Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 62 ~ 1965, p. 517-518 | -- Otte, 1995b, p. 188 | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 269 (clé), 331-335, figs. 7, 200-237 |
| -- Duranton <i>et al.</i> , 1982, p. 46, 1264, fig. 17 ~ 1987, p. 176, 177, 200, pl. I : f. 17, pl. 17 : f. 1-5 | <i>Platypterna acuta</i> | -- Kirby, 1910, p. 150 |
| -- Jago, 1983a, p. 181, 187 | -- Bolívar, 1913, p. 610 (clé) | -- Krauss, 1902b, p. 231, 236-237, fig. 2 |
| -- Johnston, 1956, p. 712-713 ~ 1968, p. 372-373 | -- Salfi, 1931, p. 269 (clé), 335-337, figs. 238-254 | -- Morales Agacino, 1947, p. 262-263 ~ 1948, p. 16 |
| -- Launois, 1978b, p. 38, 43, 266-267, pl. D1 : f. 21, figs. 1-5, | <i>Platypterna aegyptia</i> | <i>Platypterna obtusa</i> |
| -- Lecoq, 1977, p. 8 | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 267 (clé), 287-290, figs. 7, 58-66 | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 268 (clé), 324-326, figs. 7, 181-186 |
| -- Medler, 1980, p. 40 | | <i>Platypterna uvarovi</i> |
| -- Reynolds & Riley, 1988, p. 256-257, 264, 266-269 | | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 269 (clé), 342-345, figs. 7, 263-272 |
| -- Roy, 1971, p. 409 | | |


Distribution géographique

Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Mali** (Chopard, 1931 • COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1977, 1983a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Reynolds & Riley, 1988) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1971) - **Niger** (Bolívar, 1905a • Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1950 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Salfi, 1935 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Jago, 1977 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **"Rio de Oro"** (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Morales Agacino, 1947, 1948) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **"Soudan"** (Chopard, 1943c, 1952) - **Tchad** (Chopard, 1963 • Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **AO** (Duranton *et al.*, 1987 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b)

L'espèce est également citée d'Afrique du Nord et du Proche-Orient et, vers l'est, jusqu'à la Somalie, l'Arabie et, au-delà, l'Inde.

Iconographie

Habitus (im.: Duranton *et al.*, 1987 ♂♀ • Launois, 1978b ♂♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 • Launois-Luong & Lecoq, 1989 ♀) - **Autres morph.** (Duranton *et al.*, 1987 • Jago, 1977 • Krauss, 1902b • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Salfi, 1931, sous *Platypterna acuta*, *P. aegyptia*, *P. aethiopica*, *P. affinis*, *P. gracilis*, *P. obtusa* et *P. uvarovi* • Uvarov, 1924a, sous *P. aegyptia*) - **Anat.** (génit.♂: Jago, 1977)



Bio-écologie

Ochridia harterti harterti (Bolívar, 1913)

Platypterna harterti Bolívar, 1913, p. 608-609

Holotype femelle, Algérie, Aïn Guettara, north of In-Salah, MNCN Madrid

Syn. *Platypterna hebetata* Uvarov, 1926b, p. 322-326. Holotype femelle, Iran, dépositaire ? [Jago, 1977, p. 192, avec *Ochridia harterti harterti*]

Cette synonymie n'est pas acceptée par Mistshenko (1986) qui considère cette espèce valide.

Citations bibliographiques

Ochridia harterti harterti
 -- Fishpool & Popov, 1984, p. 407
 -- Jago, 1977, p. 192-195, 211, 214, 215, 216, carte 4, figs. 21, 55-56, 88-93
 -- Lecoq, 1977, p. 10 ~ 1980b, p. 580, 584-586
 -- Mestre, 1988, p. 264, 288 (clé)
 -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 ~ 2006, p. 23, 202, 1 carte
 -- Otte, 1995b, p. 189

Platypterna harterti
 -- Bolívar, 1913, p. 610 (clé)
Platypterna hebetata
 -- Salfi, 1931, p. 264-265, 269 (clé), 338-341, figs. 7, 255-262

Distribution géographique (voir carte ci-après)

? **Burkina Faso** (Lecoq, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Mauritanie** (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Niger** (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Tchad** (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **AO** (Lecoq, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Hormis la signalisation de Lecoq, à confirmer (confusion avec *O. tibialis* ?), cette sous-espèce n'est signalée que par Jago qui la cite d'Afrique du Nord et jusqu'à l'Iran.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Jago, 1977 • Salfi, 1931, sous *Platypterna hebetata*) - **Anat.** (génit.♂: Jago, 1977)

Bio-écologie

Ochridia harterti salfiana (Uvarov, 1938)

Platypterna salfiana Uvarov, 1938a, p. 155-156, fig. 3

Holotype femelle, Kenya, déserts du Turkana, Lodwar, NHM Londres

Syn. *Platypterna surcoufi* Chopard, 1936b, p. 172-173. Holotype femelle, Maroc, MNHN Paris [Jago, 1977, p. 195, avec *Ochridia harterti salfiana*]

Citations bibliographiques

Ochridia harterti salfiana
 -- Jago, 1977, p. 195-198, 211, 212, 213, 214, 215, 216, carte 5, figs. 10, 16, 28-29, 40-41, 57-59, 94
 -- Lecoq, 1980b, p. 580, 584-586
 -- Mestre, 1988, p. 264, 288 (clé)

Ochridia harterti salfiana (suite)
 -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 ~ 2006, p. 23, 202, 203, 1 carte
 -- Otte, 1995b, p. 189-190
Platypterna salfiana
 -- Uvarov, 1938a, p. 155-156, fig. 3


Distribution géographique (voir carte ci-après)

Mali (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Mauritanie** (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Nigeria** (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Sénégal** (Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **AO** (Lecoq, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)


Cette sous-espèce, qui semble avoir une répartition plus méridionale que la sous-espèce nominative, est présente vers l'est jusqu'en Somalie, Kenya et Nord-Tanzanie.

Iconographie

Habitus () - **Autres morph.** (Jago, 1977 • Uvarov, 1938a) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1977)

Bio-écologie

Ochrilidia harterti femelle,
d'après Mestre (1988)

***Ochrilidia harterti* ssp. (Bolívar, 1913)**

(pas de précision subsécifique)

Citations bibliographiques*Ochrilidia harterti*

- Chopard, 1950, p. 138 ~ 1952, p. 476
- Davey *et al.*, 1959b, p. 590
- Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29, 59, 204
- Descamps, 1967b, p. 643-644 ~ 1968, p. 575, 580
- Dirsh, 1965, p. 517-518
- Johnsen, 1981a, p. 95-96
- Johnston, 1956, p. 713 ~ 1968, p. 373
- Medler, 1980, p. 40

Ochrilidia harterti suite)

- Mestre, 1988, p. 264, 265, 288 (clé), figs. 5-6, 1 carte
- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 23, 202, 203, 1 carte
- Ochrilidia* sp. aff. *harterti*?
- Descamps, 1965b, p. 1292
- Platypterna harterti*
- Chopard, 1932, p. 871 ~ 1943c, p. 264
- Salfi, 1935, p. 168

Distribution géographique

"**French Sudan**" (Davey *et al.*, 1959b • Dirsh, 1965) - **Gambie** (Johnsen, 1981a) - **Mali** (Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **Niger** (Chopard, 1943c, 1950 • Dirsh, 1965 • Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006 • Salfi, 1935 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Medler, 1980) - **Tchad** (Chopard, 1932 • Descamps, 1967b, 1968 • Jago, 1977 • Mestre & Chiffaud, 2006) - **AO** (Lecoq, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Salfi, 1931)

La description de la deuxième sous-espèce, *O. h. salfiana*, étant tardive, les signalisations antérieures englobent les deux sous-espèces. Les signalisations sont cartographiées sous la rubrique "sous-espèce non précisée".

Iconographie


Habitus (*im.*: Mestre, 1988 ♀) - **Autres morph.** (Mestre, 1988) - **Anat.** ()

Bio-écologie

Ochrilidia tibialis (Fieber, 1853)

Platypterna tibialis Fieber, 1853, p. 98

Holotype femelle, Grèce (Crête ?), NM Vienne, perdu selon Jago (1977, p. 171)



Ochrilidia tibialis femelle, d'après Mestre (1988)


- Syn.** *Ochrilidia pruinosa* Brunner von Wattenwyl, 1882, p. 91 (clé), 92. Syntypes mâle(s), femelle(s) (holotype mâle selon Jago, 1977), Grèce (Rhodes), NM Vienne [Jago, 1977, p. 171, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Platypterna filicornis* Krauss, 1902b, p. 237-238, fig. 3. Syntypes mâle(s), femelle(s), Algérie, perdus selon Jago (1977) (DORSA : 5 syntypes au SMN Stuttgart) [Jago, 1977, p. 171, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Phlaeoba nubica* Werner, 1913, p. 219-220. Holotype femelle, Nubie, NM Vienne [Jago, 1977, p. 171, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Platypterna filicornis judaica* Salfi, 1931, p. 276 (clé), 270-275, figs. 31-34. Holotype femelle, Palestine, NHM Londres [Jago, 1977, p. 172, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Platypterna filicornis orientalis* Salfi, 1931, p. 276 (clé), 280-281, figs. 35-40. Holotype mâle, Iran, ZI Saint-Pétersbourg [Jago, 1977, p. 172, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Platypterna johnstoni* Salfi, 1931, p. 267 (clé), 282-284, figs. 41-47. Holotype mâle, Soudan, NHM Londres [Jago, 1977, p. 172, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Platypterna obsoleta* Uvarov, 1936, p. 537-538, fig. 3. Holotype femelle, Arabie Saoudite, perdu selon Jago (1977) qui désigne un paratype de même localité comme néotype femelle, NHM Londres [Jago, 1977, p. 172, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Ochrilidia pasquieri* Descamps, 1968, p. 575, 581-582. Holotype mâle, Tchad, MNHN Paris [Jago, 1977, p. 172, avec *Ochrilidia tibialis*]
- Mistshenko (1986) ne retient aucune de ces synonymies et considère ces espèces valides.

Citations bibliographiques

- | | | |
|--|--|--|
| <i>Ochrilidia filicornis</i> | 42-43, 80-82, 103 ~ 1983, p. 181, 187 | <i>Platypterna filicornis filicornis</i> |
| -- Chopard, 1941, p. 47 ~ 1950, p. 138 | -- Johnston, 1956, p. 716-717 (species ?) | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 276-279, figs. 7, 22-30 |
| -- Descamps, 1968, p. 575, 579 | -- Launois, 1978b, p. 39, 45, 268-269, pl. D2 : f. 35, figs. 1-5, | <i>Platypterna filicornis judaica</i> |
| -- Descamps & Le Breton, 1973, p. 126 | -- Launois-Luong & Launois, 1987, p. 176, 177, 199, pl. I : f. 16, pl. 16 : f. 1-5 | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 276, 279-280, figs. 7, 31-34 |
| -- Dirsh, 1965, p. 517-518 | -- Launois-Luong, 1980b, p. 781, 800-801, 804, 806-809 | <i>Platypterna filicornis orientalis</i> |
| <i>Ochrilidia filicornis filicornis</i> | -- Lecoq, 1980b, p. 580, 584-586 | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 276, 280-281, figs. 7, 35-40 |
| -- Johnston, 1956, p. 711-712 | -- Medler, 1980, p. 40 | <i>Platypterna johnstoni</i> |
| <i>Ochrilidia johnstoni</i> | -- Mestre, 1988, p. 264, 265, 288 (clé), figs. 1-4, 1 carte | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 267 (clé), 282-284, figs. 7, 41-47 |
| -- Davey <i>et al.</i> , 1959b, p. 590 | <i>Ochrilidia tibialis</i> (suite) | <i>Platypterna nubica</i> |
| -- Descamps, 1965b, p. 1292 | -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 ~ 2006, p. 23, 203-204, 1 carte | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 266 (clé), 270-275, figs. 7, 8-21 |
| <i>Ochrilidia nubica</i> | -- Mestre <i>et al.</i> , 2001, p. 325 | <i>Platypterna obsoleta</i> |
| -- Davey <i>et al.</i> , 1959b, p. 590 | -- Otte, 1995b, p. 190-191 | -- Uvarov, 1936, p. 537-538, fig. 3 |
| -- Descamps, 1965b, p. 1292 | -- Reynolds & Riley, 1988, p. 255-256, 264, 266-269 | <i>Platypterna pruinosa</i> |
| -- Dirsh, 1965, p. 517-518 | <i>Platypterna filicornis</i> | -- Bolívar, 1913, p. 610 (clé) |
| -- Golding, 1948, p. 535 | -- Bolívar, 1913, p. 610 (clé) | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 266 (clé), 284-287, figs. 7, 48-57 |
| -- Johnston, 1956, p. 715 ~ 1968, p. 373 | -- Chopard, 1941, p. 47 ~ 1943c, p. 262 | <i>Platypterna tibialis</i> |
| -- Oyidi, 1976, p. 90 | -- Dirsh, 1965, p. 517-518 | -- Bolívar, 1913, p. 610 (clé) |
| <i>Ochrilidia pasquieri</i> | -- Krauss, 1902b, p. 237-238, fig. 3 | -- Karny, 1907, p. 367 |
| -- Descamps, 1968, p. 575, 580-581 | -- Salfi, 1931, p. 275, 276 (clé sous-espèces) | -- Kirby, 1910, p. 149 |
| <i>Ochrilidia tibialis</i> | | -- Salfi, 1931, p. 264-265, 268 (clé), 322-324, figs. 7, 179-181 |
| -- Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 | | |
| -- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 | | |
| -- COPR, 1982, p. 524-525 | | |
| -- Duranton <i>et al.</i> , 1982, p. 46, 844, fig. 17 ~ 1987, p. 176, 177, 199, pl. I : f. 16, pl. 16 : f. 1-5 | | |
| -- Fishpool & Popov, 1984, p. 377 | | |
| -- Jago, 1977, p. 171-177, 211, 212, 213, 214, 215, 217, carte 1, figs. 19, | | |

Distribution géographique

Bénin (Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Mestre & Chiffaud, 2006 • *mat. exam.*) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1977, 1983 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Reynolds & Riley, 1988 • *mat. exam.*) - **Mauritanie** (COPR, 1982 • Jago, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1943c, 1950 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1977 • Launois-Luong, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1977 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Oyidi, 1976) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **AO** (Duranton *et al.*, 1987 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Lecoq, 1980b)



L'espèce est présente vers l'est jusqu'en Somalie, en Afrique du nord, Proche-Orient et Crète, Arabie et jusqu'au Pakistan.

Iconographie

Habitus (*im.*: Duranton *et al.*, 1987 ♂♀ • Launois, 1978b ♂♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 ♂♀ • Mestre, 1988 ♀) - **Autres morph.** (Duranton *et al.*, 1987 • Jago, 1977 • Krauss, 1902b • Launois, 1978b • Launois-Luong & Launois, 1987 • Mestre, 1988 • Salfi, 1931, sous *Platyperna filicornis filicornis*, *P. filic. judaica*, *P. filic. orientalis*, *P. johnstoni*, *P. nubica*, *P. pruinosa* et *P. tibialis* • Uvarov, 1936, sous *P. obsoleta*) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1977)

Bio-écologie**Ochrlidia sp.****Citations bibliographiques**

Ochrlidia sp.

- Davey, 1959, p. 127
- Davey *et al.*, 1959b, p. 591
- Descamps, 1968, p. 575, 583

Distribution géographique

Mali (Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b) - **Tchad** (Descamps, 1968)