

Pamphagulus Uvarov, 1929a, p. 99Espèce-type : *Pamphagulus bodenheimeri* Uvarov, 1929, par désignation originale

Ce genre englobe six espèces xérophiles ou franchement désertiques d'Afrique au nord du Sahara. L'extension de certains représentants vers la zone sub-saharienne, via le Sahara occidental, est à préciser.

Clé Descamps (1970, 4 espèces)***Pamphagulus uvarovi uvarovi* Ramme, 1931***Pamphagulus uvarovi* Ramme, 1931b, p. 193-194, fig. 11a, pl. 1 : f. 8

Holotype femelle, Mauritanie occidentale, Cap-Blanc à St-Louis, MNHN Paris




Citations bibliographiques*Pamphagulus uvarovi*

- Chopard, 1943c, p. 385 ~ 1952, p. 469
- Dirsh, 1965, p. 184, 185
- Johnston, 1956, p. 204
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 18, 225-226, 1 carte

-- Ramme, 1931b, p. 193-194, fig. 11a, pl. 1 : f. 8

Pamphagulus uvarovi uvarovi

- Otte, 1995a, p. 74



Pamphagulus uvarovi
d'après
Ramme (1931b)

Distribution géographique**Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ramme, 1931b)

La localité type est assez vague (Cap-Blanc à St-Louis soit 5 degrés de latitude) mais probablement du côté de la première localité.

Hormis ces signalisations, l'espèce, sans précision sub-spécifique, n'est citée que du nord du Sahara occidental et du nord-est de l'Algérie.

Iconographie**Habitus** (im.: Ramme, 1931b ♀) - **Autres morph.** (Ramme, 1931b) - **Anat.** (génit.♂:)**Bio-écologie**

Aucune information

Pamphagulus uvarovi zugjata* Morales Agacino, 1949Pamphagulus uvarovi zugjata* Morales Agacino, 1949, p. 152-153

Holotype femelle, Rio de Oro, Zug (= Zoug, Zûg), MNCN Madrid

Citations bibliographiques*Pamphagulus uvarovi zugjata*

- Johnston, 1956, p. 204
- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 18, 226, 1 carte
- Morales Agacino, 1949, p. 152-153
- Otte, 1995a, p. 74

Distribution géographique**"Rio de Oro"** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Morales Agacino, 1949)


Cette sous-espèce n'est signalée que par le matériel type. Compte-tenu de sa répartition et des critères distinctifs peu significatifs indiqués par Morales Agacino par rapport à la sous-espèce nominative, son statut est à préciser.

Iconographie

Habitus (im.:) - **Autres morph.** () -
Anat. (génit.♂:)

Bio-écologie

Aucune information

**Pamphagulus vicinus** Ramme, 1931

Pamphagulus vicinus Ramme, 1931b, p. 194, 195-196, fig. 11b
 Holotype femelle, Mauritanie, près de Cap Blanc, MNHN Paris



Syn. *Pamphagulus mateui* Morales Agacino, 1949, p. 153-157, fig. 1. Holotype mâle, Rio de Oro (= *Sahara occidental*), MNCN Madrid [Descamps, 1970, p. 28, avec *Pamphagulus vicinus*]

Dans sa mise en synonymie Descamps n'évoque pas le cas de la sous-espèce *P. mateui audebdidetensis*, décrite du Rio de Oro en même temps que la sous-espèce nominative et non citée par la suite ; nous l'intégrons ici dans les citations mais son statut serait à vérifier.

Citations bibliographiques

- Pamphagulus mateui*
 -- Morales Agacino, 1949, p. 153-157, fig. 1
Pamphagulus mateui audebdidetensis ?
 -- Morales Agacino, 1949, p. 157-158
Pamphagulus vicinus
 -- Chopard, 1943c, p. 384 ~ 1952, p. 469
 -- Descamps, 1970, p. 28-29, figs. 5-6
 -- Dirsh, 1965, p. 184, 185
 -- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 ~ 2006, p. 18, 226, 1 carte
 -- Johnston, 1956, p. 204
 -- Morales Agacino, 1949, p. 151-152
 -- Otte, 1995a, p. 75
 -- Ramme, 1931b, p. 194, 195-196, fig. 11b

Pamphagulus vicinus
 d'après
 Ramme (1931b)



Pamphagulus mateui
 (= *P. vicinus*)
 mâle, d'après
 Morales Agacino, (1949)

Distribution géographique

Mauritanie (Chopard, 1943c, 1952 • Descamps, 1970 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Ramme, 1931b) - "**Rio de Oro**" (Morales Agacino, 1949)

L'espèce est également signalée du Maroc.

Iconographie

Habitus (im.: Ramme, 1931b, ♂, sous *P. mateui*) - **Autres morph.** (Descamps, 1970 • Ramme, 1931b) - **Anat.** (génit.♂: Dirsh, 1965, sous *P. mateui*)

Bio-écologie

Aucune information.

