

Parakinkalidia Donskoff, 1986, p. 211-212

Espèce-type : *Parakinkalidia rothi* Donskoff, 1986, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

Parakinkalidia rothi Donskoff, 1986

Parakinkalidia rothi Donskoff, 1986, p. 212-214, figs. 47-63

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Citations bibliographiques

Parakinkalidia rothi

- Couturier *et al.*, 1984, p. 168-169
- Donskoff, 1986, p. 212-214, figs 47-63
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 ~ 2006, p. 20, 229, 1 carte
- Otte, 1995b, p. 18


Distribution géographique

Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997)

L'espèce n'est connue que par le couple de la série type.

Iconographie

Habitus (im.: Donskoff, 1986, ♂) - **Autres morph.** (Donskoff, 1986) - **Anat.** (génit.: Donskoff, 1986, ♂♀)

**Bio-écologie**

Aucune information.

Couturier *et al.* (1984) considèrent que cette espèce est indubitablement forestière même si le seul spécimen collecté a été trouvé dans un défrichement récent.

Ce cas, ainsi que celui d'autres Cyrtacanthacridinae comme *Taiacris* et *Mabacris*, soulève le problème de l'échantillonnage des milieux forestiers et plus particulièrement de la canopée.