

*Pseudogmothela* Karny, 1910, p. 79Espèce-type : *Pseudogmothela rehni* Karny, 1910, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical d'au moins onze espèces.

Le travail de Roy (2002) a montré qu'il y avait trois espèces confondues sous le nom *P. foveolata* en Afrique de l'Ouest. Les signalisations à préciser ont été regroupées sous *Pseudogmothela* sp.**Syn.** *Pachycarus* Uvarov, 1921c, p. 383-384 [Uvarov, 1929b, p. 43, avec *Pseudogmothela*]***Pseudogmothela foveolata* Roy, 1965***Pseudogmothela foveolata* Roy, 1965, p. 628-630, figs. 2-3

Holotype mâle, Sénégal, Tabi (Basse-Casamance), MNHN Paris

**Syn.** *Pseudogmothela cheradophila* Jago, 1966b, p. 352, 355-357, figs. 33-38. Holotype mâle, Mali, NHM Londres  
[Jago, 1967b, p. 266, avec *Pseudogmothela foveolata*]**Citations bibliographiques***Pseudogmothela cheradophila*  
-- Jago, 1966b, p. 352, 355-357, figs. 33, 34 ?, 35-38 (partie Mali et Sénégal, le matériel ♀ Ghana = *P. jagoi*) (fig. 34 = ♀ sp. ? cf. *jagoi*)  
-- Johnston, 1968, p. 382*Pseudogmothela foveolata*  
-- Johnston, 1968, p. 382  
-- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 23, 243, 1 carte*Pseudogmothela foveolata* (suite)  
-- Otte, 1995b, p. 215  
-- Roy, 1965, p. 628-630, figs. 2-3 ~ 1970, p. 703 ~ 2002, p. 5, 6-7, 8, 9, 10, fig. 1**Distribution géographique****Gambie** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002) - **Guinée-Bissau** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002) - **Mali** (Jago, 1966b • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002) - **Sénégal** (Jago, 1966b • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 1965, 1970, 2002)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

**Iconographie****Habitus** (*im.*: Roy, 1965 ♂) - **Autres****morph.** (Jago, 1966b, sous *P. cheradophila* • Roy, 1965) - **Anat.** (génit. ♂: Jago, 1966b, sous *P. cheradophila*)**Bio-écologie**

Les données disponibles montrent une seule génération annuelle avec passage de la saison sèche sous forme d'oeufs (Roy, 2002).

***Pseudogmothela jagoi* Roy, 2002***Pseudogmothela jagoi* Roy, 2002, p. 8, 9, 10, fig. 2 (carte)

Holotype mâle, Mali, Koutiala, MNHN Paris

**Citations bibliographiques***Pseudogmothela cheradophila* (partie, femelles Ghana = *P. jagoi* selon Roy, 2002)  
-- Jago, 1966b, p. 352, 355-357, fig. 34 ? (fig. 34 = ♀ sp. ? cf. *foveolata*)  
*Pseudogmothela foveolata*  
-- Jago, 1968, p. 33 (Ghana cf. Roy, ci-dessus)*Pseudogmothela jagoi*  
-- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 23, 243-244, 1 carte  
-- Roy, 2002, p. 5, 6, 8, 9, 10, fig. 2 (carte)  
*Pseudogmothela* sp.  
-- Mestre *et al.*, 2001, p. 326 (*mat. exam.*)**Distribution géographique****Bénin** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • Roy, 2002 • *mat. exam.*) - **Cameroun** (Roy, 2002) - **Ghana** (Jago, 1966b (partie, matériel Ghana) • Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002) - **Mali** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002 • *mat. exam.*) - **Niger** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002) - **Nigeria** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002) - **Togo** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002 • *mat. exam.*)


Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Jago, 1966b, partie, femelle Ghana) - **Anat.** (?)


**Bio-écologie**

Les données disponibles montrent une seule génération annuelle avec passage de la saison sèche sous forme d'oeufs (Roy, 2002).

**Pseudogmothela yonlii** Roy, 2002

*Pseudogmothela yonlii* Roy, 2002, p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, figs. 1, 2 (carte)

Holotype mâle, Burkina Faso, Kamboinsé (12 km au nord de Ouagadougou), MNHN Paris



*Pseudogmothela yonlii* femelle, d'après Mestre (1988), sous *P. foveolata* (mat. exam.)

**Citations bibliographiques**

*Pseudogmothela foveolata*

- (dét. rectifiée *P. yonlii*, mat. exam.)
- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 335
- Mestre, 1988, p. 275 (illustrations femelle)
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 (partie Niger) ~ 2006, p. 23, 244, 1 carte


*Pseudogmothela yonlii*

- Roy, 2002, p. 5, 6, 7, 8, 9, 10, figs. 1, 2 (carte)

**Distribution géographique**

**Burkina Faso** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002 • mat. exam.) - **Ghana** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 2002 • mat. exam.) - **Nigeria** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Roy, 2002)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

**Iconographie**

**Habitus** (im.: Mestre, 1988 ♀, sous *P. foveolata* • Roy, 2002 ♀) - **Autres morph.** (Mestre, 1988, sous *P. foveolata*) - **Anat.** ()

**Bio-écologie**

Au sud-est du Niger (région de Tamou), nous avons essentiellement observé cette espèce dans la strate herbacée ou sur le sol en savane arbustive. Elle affectionne notamment la couronne de végétation herbacée à dominante graminéenne poussant sous les

arbustes. C'est aussi l'endroit où elle se réfugie en cas de dérangement.

Comme les autres espèces, elle a une génération annuelle avec passage de la saison sèche sous forme d'oeufs (Roy, 2002 ; obs. pers.).

**Pseudogmothela** sp.

(= *P. foveolata*, *P. jagoi* ou *P. yonlii*)

**Citations bibliographiques***Pseudogmothela foveolata*

- Cornes & Riley, 1972, p. 14
- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477
- Descamps, 1965b, p. 1292, 1295-1296, figs. 76-79
- Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164
- Fishpool & Popov, 1984, p. 380
- Jago, 1967b, p. 246 ~ 1968, p. 339
- Johnston, 1968, p. 382
- Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 70, fig. 19 ~ 1980b, p. 581, 588 ~ 1984, p. 231, 239

*Pseudogmothela foveolata* (suite)

- Medler, 1980, p. 41
- Mestre, 1988, p. 274, 275 (dessins = *P. yonlii*, mat. exam.)
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 (mat. Niger cf. *P. yonlii*) ~ 2006, p. 244
- Otte, 1995b, p. 215
- Oyidi, 1977, p. 4, 6, 16, 23 ~ 1978, p. 7, 8, 10, 12

**Distribution géographique**

**Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)