

Sherifuria Uvarov, 1926a, p. 421-422


Espèce-type : *Sherifuria haningtoni* Uvarov, 1926a, par désignation originale et monotypie

Genre afrotropical monospécifique.

***Sherifuria haningtoni* Uvarov, 1926**

Sherifuria haningtoni Uvarov, 1926a, p. 422, pl. 47 : f. 3, 4, 5

Holotype mâle, Sherifuri, Nord-Nigeria, NHM Londres



Sherifuria haningtoni femelle, d'après Mestre (1988)

Citations bibliographiques

Sherifuria haningtoni

- Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 335
- Cornes & Riley, 1972, p. 12
- Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476, 477, fig. 8
- Davey, 1959, p. 127
- Davey *et al.*, 1959b, p. 567
- Descamps, 1965b, p. 1259, 1266 ~ 1968, p. 561, 563
- Descamps & Le Breton, 1973, p. 119
- Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 54 : f. 9 ~ 1965, p. 435, 436, fig. 347a-c
- Duranton & Lecoq, 1980, p. 153, 156, 158, 160, figs. 2, 4, 6
- Duranton *et al.*, 1982, p. 1272
- Duranton *et al.*, 1987, p. 210, pl. 27
- Fishpool & Popov, 1984, p. 355
- Golding, 1948, p. 531

Sherifuria haningtoni (suite)


- Johnsen, 1981a, 90, 91, 92, figs. 9, 10a-c ~ 1981b, p. 155
- Johnston, 1956, p. 627 ~ 1968, p. 307
- Launois, 1978b, p. 30, figs. A1-2
- Launois-Luong & Launois, 1987, p. 210, pl. 27
- Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 243 ~ 1980a, p. 62-63, fig. 13 ~ 1980b (clé), p. 564, 568 ~ 1984, p. 231, 236
- Medler, 1980, p. 41
- Mestre, 1988, p. 186, 187, figs. 5-6, 1 carte
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 ~ 2006, p. 21, 263-264, 1 carte
- Mestre *et al.*, 2001, p. 321
- Otte, 1995b, p. 304

Sherifuria haningtoni (suite)

- Oyidi, 1976, p. 86 ~ 1977, p. 17 ~ 1978, p. 8
 - Paraíso *et al.*, 2012, p. 36
 - Popov, 1959b, p. 50 ~ 1989, p. 102-103, figs.
 - Popov *et al.*, 1990, p. 100-101, pl. 19 : 2 figs., 1 carte
 - Roy, 1962, p. 111, 132 ~ 1965, p. 627 ~ 1969a, p. 216
 - Uvarov, 1926a, p. 422, pl. 47 : f. 3, 4, 5
- Sherifugia hanningtoni* (sic)
- Risbec, 1950a, p. 424
- Sherifuria* sp.
- Johnston, 1956, p. 627
 - Risbec, 1950a, p. 121 (*Sherifugia*, sic)

Distribution géographique

Bénin (Fishpool, *comm. pers.* • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • Paraíso *et al.*, 2012 • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Duranton *et al.*, 1982 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **Ghana** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Mali** (Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Popov, 1959b • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool, *comm. pers.* • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Roy, 1962, 1965, 1969a • *mat. exam.*) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Popov *et al.*, 1990) - **Togo** (Mestre & Chiffaud, 2006 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1965 • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Risbec, 1950a)



Cette espèce n'a été jusqu'ici signalée que de notre zone d'étude. Nous avons représenté les signalisations béninoises de Paraíso *et al.* (2012) par une couleur différente (rose), les divers autres auteurs ne l'observant pas aussi bas. On ne voit cependant pas avec quelle autre espèce il y aurait eu confusion.

Elle semble moins commune vers l'est, Descamps ne la signalant pas du nord-Cameroun (1953), malgré une étude intensive, et n'indiquant qu'un seul spécimen pour le Tchad (1968).

Iconographie

Habitus (*juv.*: Popov, 1989 ▫ *im.*: Dirsh, 1965 ♂ • Duranton *et al.*, 1987 ♀ • Johnsen, 1981a ♀ • Launois, 1978b ♀ • Launois-Luong & Launois, 1987 ♀ • Mestre, 1988 ♀ • Popov *et al.*, 1990 ♀) - **Autres morph.** (Dirsh, 1965 • Duranton *et al.*, 1987 •

Launois-Luong & Launois, 1987 • Mestre, 1988 • Uvarov, 1926a) - **Anat.** (génit. ♂: Dirsh, 1956c, 1965) - **Ooth.** (Popov *et al.*, 1990)

Bio-écologie

Cette espèce soudanienne mésophile est observée principalement dans les tapis herbacés denses poussant à la périphérie plus ou moins ombragée des arbustes et bosquets d'arbustes.

Très localisée ou rare dans certaines parties de son aire de répartition, elle peut cependant être commune dans ses biotopes de prédilection.

Les données les plus précises montrent des imagos de fin juillet à novembre, parfois décembre (Fishpool &

Popov, 1984 ; Lecoq, 1978a, 1980a ; Paraiso *et al.*, 2012 ; nos propres observations au Niger de 1989 à 1992). Les juvéniles, au développement rapide, sont observés de juin à septembre.

Il y a ainsi une génération par an avec passage de la saison sèche sous forme d'oeufs.

Elle est a priori graminivore, ainsi que l'indiquent Fishpool & Popov.