

Calliptenus (Sphodromerus) Stål, 1873b, p. 72

Espèce-type : *Calliptamus serapis* Audinet-Serville, 1838, par désignation originale et monotypie

Genre comprenant près d'une trentaine d'espèces afrotropicales, saharo-arabiques et orientales.

Syn. *Kripa* Kirby 1914b, p. 195 (clé), 257 [Uvarov, 1938b, p. 379]

***Sphodromerus tuareg mirei* Descamps, 1968**

Sphodromerus tuareg mirei Descamps, 1968, p. 548-549

Holotype mâle, Tchad, Tibesti, bassin de Koudou (Emi Koussi, 1950 m), MNHN Paris

Citations bibliographiques

Sphodromerus tuareg [tuareg]

-- Dirsh, 1965, p. 253, 254, fig. 194

Sphodromerus tuareg mirei

-- Descamps, 1968, p. 548-549

-- Lecoq, 1980b (clé), p. 548, 550

-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 ~
2006, p. 19, 269-270, 1 carte

Distribution géographique

Tchad (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Cette sous-espèce, distinguée sur la base de la coloration interne des fémurs postérieurs, n'a été jusqu'ici citée que du Tibesti tchadien.

La sous-espèce nominative est connue du Sahara algérien et libyen.

Iconographie

Habitus (im.: Dirsh, 1965, *S. tuareg* - **Autres morph.** () - **Anat.** (génit.♂: Dirsh, 1965, *S. tuareg*)

En l'absence d'illustrations de la sous-espèce *mirei*, nous indiquons ici celles concernant la sous-espèce nominative.

Bio-écologie

Aucune information.

Les spécimens de la série-type ont été collectés entre 1950 et 2000 m d'altitude.

