

*Vosseleriana* Uvarov, 1924a, p. 31 (note infrapaginale)  
Espèce-type : *Helioscirtus fonti* Bolívar I., 1902b, par désignation originale

Genre de 7 espèces xérophiles, essentiellement sahariennes, et deux espèces de l'Arabie au Pakistan.

**Syn.** *Mistshenkoa* Bey-Bienko, 1950, p. 202 [Dirsh, 1961b, p. 396, avec *Vosseleriana*]

**Clé** Baccetti (2004, 6 espèces africaines). L'une d'entre elles, *V. schulthessi* Uvarov, est généralement considérée appartenir au genre *Thalpomena* alors que Dirsh (1965) l'intègre à *Vosseleriana*.

***Vosseleriana eburnea* Baccetti, 2004**

*Vosseleriana eburnea* Baccetti, 2004, p. 30-31, fig. 8  
Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Grand-Bassam, dépositaire non indiqué (Sienna ?)

**Citations bibliographiques**

*Vosseleriana eburnea*  
-- Baccetti, 2004, p. 30-31, fig. 8  
-- Mestre & Chiffaud, 2006, p. 22, 299,  
1 carte

**Distribution géographique**

**Côte d'Ivoire** (Baccetti, 2004)  
Cette espèce récemment décrite n'est connue que par la série-type.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Baccetti, 2004) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information. Cette espèce a été trouvée sur les plages sableuses du littoral ivoirien. C'est la seule qui ne soit pas associée aux milieux désertiques ou sub-désertiques. Cette signalisation, très atypique, est donc particulièrement intéressante si l'appartenance au genre est confirmée.



***Vosseleriana fonti* (Bolívar, 1902)**

*Helioscirtus fonti* Bolívar I., 1902b, p. 291-292 (et 1902a, p. 275-276)  
Holotype mâle, Rio de Oro (= *Sahara occidental*), MNCN Madrid

**Citations bibliographiques**

*Helioscirtus fonti*  
-- Bolívar I., 1902a, p. 275-276 ~ 1902b  
291-292 ~ 1914b, p. 197  
-- Kirby, 1910, p. 281  
*Sphingonotus fonti*  
-- Chopard, 1943c, p. 311  
-- Mistshenko, 1936, p. 100-101  
-- Morales Agacino, 1945a, p. 328, 339,  
pl. 22 : f. G  
*Vosseleriana fonti*  
-- Dirsh, 1965, p. 463-464, 465, fig. 374  
-- Johnston, 1956, p. 496 ~ 1968, p. 325  
-- Uvarov, 1924a, p. 31 (note infra-  
paginale)(comb. nov.)

**Distribution géographique**

**Rio de Oro** (Bolívar I., 1902a, 1914b •  
Chopard, 1943c • Dirsh, 1965 •  
Mistshenko, 1936 • Morales Agacino,  
1945a)


Cette espèce est également citée du Maroc et d'Algérie.

**Iconographie**

**Habitus** (Dirsh, 1965, ♂) - **Autres morph.** (Morales Agacino, 1945a) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information. Morales Agacino (1945a) indique l'avoir trouvée sur des sols pierreux et souligne le bruit qu'elle fait en volant.



**Vosseleriana korsakovi** (Chopard, 1943)

*Sphingonotus korsakovi* Chopard, 1943b, p. 145-146  
Holotype mâle, Algérie, oasis de Taghela, MNHN Paris

**Citations bibliographiques**

*Mistshenkoa korskovi*

-- Johnston, 1956, p. 496

*Vosseleriana korsakovi*

-- Descamps, 1968, p. 561, 566

-- Dirsh, 1965, p. 463, 464

-- Johnston, 1968, p. 325

-- Lecoq, 1980b, p. 569, 573

-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~


2006, p. 22, 299-300, 1 carte

-- Otte, 1995b, p. 440

**Distribution géographique**

**Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006) - **AO** (Lecoq, 1980b)

Hormis la signalisation tchadienne, l'espèce n'est citée que d'Algérie et de Lybie.

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information.

**Vosseleriana strepens** (Uvarov, 1938)

*Sphingonotus strepens* Uvarov, 1938c, p. 600-602  
Holotype mâle, Mauritanie, Zemmour, Kedia Guengoum, MNHN Paris

**Citations bibliographiques**

*Mistshenkoa strepens*

-- Johnston, 1956, p. 496

*Sphingonotus strepens*

-- Chopard, 1943c, p. 320-321, fig. 492 ~

1952, p. 474

-- Dekeyser & Villiers, 1956, p. 29,

105, 210

-- Uvarov, 1938c, p. 600-602

*Vosseleriana strepens*

-- Dirsh, 1965, p. 464-465, 465

-- Johnston, 1968, p. 325

-- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 ~

2006, p. 22, 300, 1 carte

-- Otte, 1995b, p. 440

**Distribution géographique**

**Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997, 2006 • Uvarov, 1938c)

Les signalisations d'Uvarov sont du Zemmour, au nord de la Mauritanie, et donc en dehors de notre zone d'étude *sensu stricto*. Cette espèce est signalée par ailleurs du nord du Sahara occidental et de l'est algérien (la signalisation du Tchad de Mestre & Chiffaud, 1997, est une erreur).

**Iconographie**

**Habitus** (?) - **Autres morph.** (Chopard, 1943c) - **Anat.** (?)

**Bio-écologie**

Aucune information précise.

Cette espèce désertique produit, d'après Zolotarevsky (cité par Uvarov, 1938c et Chopard, 1943c), un bruit assez fort en volant.

