

exam.) - **Ghana** (COPR, 1982 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1923b) - **Guinée** (COPR, 1982 • Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b, 1965 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • Sjöstedt, 1923b • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Sjöstedt, 1923b) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kevan & Roy, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Togo** (I. Bolívar, 1894, 1904b • Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1923b)



C'est la sous-espèce ouest-africaine, remplacée en Afrique centrale et orientale par la sous-espèce nominative.

DIGENTIA Stål, 1878

Oxyinae

Digentia Stål, 1878, p. 47

Espèce-type : *Oxya punctatissima* Stål, 1875, p. 33

Syn.: *Genditia* I. Bolívar, 1911, p. 301 [Hollis, 1975, p. 223, avec *Digentia*]

Genre afrotropical comprenant cinq espèces.

⊍ *Digentia punctatissima* (Stål, 1875) (? , présence à confirmer)

Oxya punctatissima Stål, 1875, p. 33

Holotype mâle, "Africa occidentalis", NR Stockholm

Cit.: *Digentia punctatissima*

Dirsh, 1965, p. 237 ~ 1970, p. 121 • Hollis, 1975, p. 215, 223 • Jago, 1968, p. 245 • Johnston, 1956, p. 256-257 • Kirby, 1910, p. 395 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Otte, 1995a, p. 129 • Ramme, 1929, p. 321-323, 484

Oxya punctatissima

Stål, 1875, p. 33

Dist.: Hormis l'holotype, en mauvais état selon Dirsh (1970) et dont l'origine géographique précise n'est pas connue, cette espèce est citée du Congo, du Zaïre et de l'île de Fernando Poo (aujourd'hui Bioko ou Bioko), dans le golfe de Guinée.

La signalisation de Karsch (1893, p. 109) pour le Togo correspondait en fait à *Pododula ancisa* décrite 3 ans plus tard par le même Karsch (1896). Il est très possible que *Digentia punctatissima* ne soit pas présente dans notre zone d'étude, l'Afrique occidentale ayant souvent un sens assez large chez les auteurs anciens, englobant parfois une partie de l'Afrique centrale.

DNOPHERULA Karsch, 1896

Gomphocerinae

Dnopherula Karsch, 1896, p. 259

Espèce-type : *Dnopherula callosa* Karsch, 1896, p. 259

Syn.: *Ticra* I. Bolívar, 1909b, p. 294 [Uvarov, 1953b, p. 177, avec *Dnopherula*]

Ce genre, comprenant des espèces afrotropicales et orientales, a été revu par Jago (1996) qui a invalidé certaines synonymies génériques et spécifiques de Hollis (1966).

Cela a abouti au transfert de certaines espèces ouest-africaines dans différents autres genres, existants (*Aulacobothrus*, pour *D. invenusta* et *D. obscura*), réhabilités (*Berengueria*, pour *D. bifoveolata*) ou nouveaux (*Crucinotacris*, pour *D. werneriana*, et *Leionotacris*, pour *D. gilloni*).

⊍ *Dnopherula descampsi* Hollis, 1966

Dnopherula descampsi Hollis, 1966, p. 302-304, fig. 11, 25, 79-83

Holotype mâle, Sierra Leone, Kukuna, NHM Londres

Syn.: *Phorenula acerosa* Jago, 1966b, p. 359-361. Holotype mâle, Ghana, NHM Londres

[Jago, 1967b, p. 266, avec *Dnopherula descampsi*]

Cit.: *Dnopherula descampsi*

Cornes & Riley, 1972, p. 15 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279-280 • Fishpool & Popov, 1984, p. 382 • Hollis, 1966, p. 278 (clé), 302-304 • Jago, 1967b, p. 246, 247 ~ 1968, p. 334-335 • Johnston, 1968, p.

386 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980a, p. 70 ~ 1980b, p. 581, 588-589 • Medler, 1980, p. 39
 • Mestre, 1988, p. 282-283, 289 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325 • Otte, 1995b, p. 146 •
 Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 344

Phonerula acerosa


Jago, 1966b, p. 359-361, 366-367 ~ 1967b, p. 246-247

Phonerula sp. A (= *D. descampsi* selon Jago, 1966b)

Chapman, 1962, p. 52-53, 62

Phonerula n. sp.

Descamps, 1965b, p. 1260, 1294



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Hollis, 1966 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1966b, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Hollis, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1966b • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Sierra Leone (Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

⊃ *Dnopherula phippsi* (Llorente, 1963)

Phonerula phippsi Llorente, 1963, p. 51-56, fig. 1-3

Holotype mâle, Sierra Leone, Kabala, NHM Londres

Cit.: *Aulacothrus sp.* (= *Dnopherula phippsi* selon Phipps, 1970, p. 344)

Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 344

Dnopherula phippsi

Cornes & Riley, 1972, p. 15 • Fishpool & Popov, 1984, p. 383 • Hollis, 1966, p. 277 (clé), 299-302 • Jago, 1968, p. 335 • Johnston, 1968, p. 388 • Lecoq, 1977, p. 8 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 71 ~ 1980b, p. 581, 588-589 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 284-285, 289 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 325 • Otte, 1995b, p. 147 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 344 • Roy, 1969a, p. 220

Phonerula phippsi

Descamps, 1965b, p. 1292, 1293 • Llorente, 1963, p. 51

Phonerula sp. 2 et *P. sp. 3* (Err. dét. pour *D. phippsi* selon Roy, 1969a, p. 198)


Roy, 1962, p. 111, 113, 134

Phonerula sp. C (= *D. phippsi* selon Jago, 1968, p. 335)

Chapman, 1962, p. 54

Phonerula near phippsi (= *Phonerula sp. C* de Chapman, 1962 selon Jago, 1967b, p. 258)

Jago, 1967b, p. 258



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Lecoq, 1977, 1978a, 1980a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Hollis, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965b • Hollis, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - Sénégal (Hollis, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - Sierra Leone (Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Llorente, 1963 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Togo (Fishpool & Popov, 1984) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

u ***Dnopherula punctata*** (Uvarov, 1926)

Aulacobothrus punctatus Uvarov, 1926a, p. 432, pl. 47 : f. 11, 12

Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

Cit.: *Aulacobothrus punctatus*


Golding, 1948, p. 538 • Johnston, 1956, p. 666 • Uvarov, 1926a, p. 432-434, pl. 47 ~ 1953, p. 167

Dnopherula punctata

Cornes & Riley, 1972, p. 15 • Descamps, 1968, p. 575 • Dirsh, 1964, p. 80 ~ 1965, p. 542 ~ 1970, p. 571 • Fishpool & Popov, 1984, p. 409 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 333 • Johnston, 1968, p. 388 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 581, 588-589 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 284-285, 289 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 147 • Roy, 1969a, p. 220

Phonerula punctata

Dirsh, 1965, p. 540-541



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984) - Ghana (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Dirsh, 1970 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1966 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Uvarov, 1926a, 1953) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce est signalée également de Tanzanie (d'après Jago, 1996b, p. 85).

u ? ***Dnopherula sp.***

Cit.: *Dnopherula sp.*

Davey *et al.*, 1959b, p. 587 • Gillon, 1971, p. 419-471

Dist.: Côte d'Ivoire (Gillon, 1971) - Mali (Davey *et al.*, 1959b)

DURONIA Stål, 1876

Acridinae

Phloeoba (Duronium) Stål, 1876a, p. 21

Espèce-type : *Phloeoba (Duronium) chloronota* Stål, 1876b, p. 48 [Karsch, 1900, p. 276]

Syn.: *Rodunia* l. Bolívar, 1908c, p. 100 [Rehn, 1914, p. 77, avec *Duronium*]

On se reportera à Uvarov (1953, p. 142-144) pour un historique de ce genre afrotropical qui comprend deux espèces.

u ***Duronium chloronota*** (Stål, 1876)

Phloeoba (Duronium) chloronota Stål, 1876b, p. 48

Syntypes mâle(s), femelle(s), Afrique du Sud-Ouest, Damara, NM Vienne. Lectotype mâle signalé par Dirsh (1970, p. 434).

Syn.: *Phlaeoba sanguinolenta* l. Bolívar, 1889a, p. 96-97. Type femelle, Angola, perdu selon Dirsh (1966)

[Dirsh, 1966, p. 393, avec *Duronium chloronota*]

Phlaeoba viridula var. *litturata* l. Bolívar, 1889a, p. 98. Type Angola, détruit

[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronium chloronota*]

Phlaeoba laeta l. Bolívar, 1890b, p. 310. Syntypes mâle(s), femelle(s), Madagascar, détruits

[Dirsh, 1963a, p. 255, avec *Duronium chloronota*]

Phlaeoba tricolor Karny, 1907, p. 368-369, pl. 3. Lectotype mâle (Dirsh, 1962), Soudan, NM Vienne

[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronium chloronota*]

Rodunia acuminata l. Bolívar, 1912b, p. 78. Type mâle (Holotype selon Dirsh, 1962), Zaïre, MRAC Tervuren

[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronium chloronota*]

Duronium victoriana Rehn, 1914, p. 77. Holotype femelle, Ouganda, MNHU Berlin (DORSA : non recensé)

[Dirsh, 1962, p. 86, avec *Duronium chloronota*]

Cit.: *Duronium chloronota*

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 336 • COPR, 1982, p. 390-392 • Cornes & Riley, 1972, p. 12 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p.