

1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - **Liberia** (COPR, 1982 • Johnsen, 1971 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Descamps, 1965a • Dirsh, 1956a, 1966 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b) - **Niger** (*mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1956a • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1965, 1969a • *mat. exam.*) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970) - **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1956a, 1964, 1966 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1965 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Risbec, 1950a)



L'espèce est également citée du Soudan, du Congo, du Zaïre, d'Ouganda, de Zambie, du Zimbabwe et d'Angola.

EYPREPOCNEMIS Fieber, 1853

Eyrepocnemidinae

Eyrepocnemis Fieber, 1853, p. 98

Espèce-type : *Gryllus plorans* Charpentier, 1825, p. 134 [Kirby, 1910, p. 559-560]

Syn.: *Euprepocnemis* Stål, 1873b, p. 75 (orth. subs. incorrecte) [Uvarov, 1943h, p. 25, avec *Eyrepocnemis*]

Ce genre, qui englobe plus d'une trentaine d'espèces paléarctiques, afrotropicales et orientales, a été cité longtemps de manière incorrecte comme *Euprepocnemis* à la suite de Stål (1873b). Il a été révisé par Uvarov (1921) puis par Dirsh (1958b).

Cinq espèces sont présentes en Afrique de l'Ouest, dont l'une, *E. plorans*, regroupe plusieurs sous-espèces. Pour cette dernière espèce, les signalisations sans précision subs spécifique sont regroupées sous *E. plorans ssp.*


⊔ *Eyrepocnemis djeboboensis* Jago, 1962

Eyrepocnemis djeboboensis Jago, 1962, p. 137-139, fig. 2, 3, 5, 6, 8

Holotype mâle, Ghana, Trans Volta Region, North-East of Ketu Krachi (near Nkwanta), NHM Londres

Cit.: *Eyrepocnemis djeboboensis*

Dirsh, 1965, p. 285 • Jago, 1962, p. 137-139 ~ 1967b, p. 246 ~ 1968, p. 279-280 • Johnston, 1968, p. 206 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 178 • Roy, 1966, p. 39



Dist.: **Ghana** (Dirsh, 1965 • Jago, 1962, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Roy, 1966 • *mat. exam.*)

Cette espèce brachyptère n'est connue que de la zone montagneuse située de part et d'autre de la frontière entre le Togo et le Ghana.

⊔ *Eyrepocnemis dorsalensis* Roy, 1964

Eyrepocnemis dorsalensis Roy, 1964b, p. 1167-1173, fig. 13-16

Holotype mâle, allotype femelle, Sierra Leone, Mont Bintumane (Monts Loma), MNHN Paris


Cit.: *Euprepocnemis montana* (Err. dét. pour *E. dorsalensis* selon Roy, 1964a, p. 1172)

Chopard, 1958a, p. 139

Eyrepocnemis dorsalensis

Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Jaeger *et al.*, 1966, p. 1183 • Johnsen, 1971, p. 30, 31, 32, 33 • Johnston, 1968, p. 206 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 178 • Phipps, 1970, p. 327 ~ 1971, p. 84 • Roy, 1964b, p. 1155, 1167-1173 ~ 1966, p. 37, 39 ~ 2003, p. 337, 380, 387

Eyrepocnemis plorans ibandana (pour partie, err. dét. pour *E. dorsalensis* selon Roy, 1964a, p. 1172)
Dirsh, 1963b, p. 212





Dist.: Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964b, 1966 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Johnsen, 1971 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964b, 1966, 2003) - Sierra Leone (Jaeger *et al.*, 1966 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970, 1971 • Roy, 1964b, 1966)

Cette espèce brachyptère n'est connue que des zones d'altitude de la dorsale guinéenne.

u *Eyrepocnemis noxia* Dirsh, 1950

Eyrepocnemis noxius Dirsh, 1950a, p. 317-318, fig. 2, 4
Holotype mâle, Soudan, 30 miles west of Gedaref, NHM Londres

Cit.: *Eyrepocnemis noxia* (-us)
COPR, 1982, p. 243-244 • Davey *et al.*, 1959a, p. 100 • Descamps, 1965a, p. 951~ 1965b, p. 1308 ~ 1967b, p. 656 ~ 1968, p. 549, 550 • Dirsh, 1950, p. 317 ~ 1958b, p. 35, 41 ~ 1965, p. 285, 286 • Fishpool & Popov, 1984, p. 337 • Johnston, 1968, p. 207 • Lecoq, 1978b, p. 241-258 ~ 1980b, p. 551-552 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 118-119 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 179



Dist.: "French Sudan" (Dirsh, 1958b, 1965) - Ghana (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mauritanie (Mestre, 1988 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Dirsh, 1950 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nord-Cameroun (Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce sub-saharienne, commune voire nuisible au Soudan, est plus rarement citée dans notre zone d'étude. Elle est signalée également d'Éthiopie, d'Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie.

u *Eyrepocnemis plorans ibandana* Giglio-Tos, 1907

Eyrepocnemis ibandana Giglio-Tos, 1907a, p. 1-2.
Syntypes mâles, femelles, Ouganda, Ibanda, MRSN Turin

Syn.: *Euprepocnemis ibandana* var. *nigromaculata* Uvarov, 1921b, p. 114. Holotype femelle, Ouganda, NHM Londres [Dirsh, 1958b, p. 39, avec *Euprepocnemis plorans ibandana*]
Euprepocnemis ibandana longipennis Uvarov, 1921b, p. 114-115. Holotype mâle, Sierra Leone, NHM Londres [Dirsh, 1958b, p. 39, avec *Euprepocnemis plorans ibandana*]


Cit.: *Euprepocnemis ibandana*
 Golding, 1948, p. 559, 576, 578-584 • Kirby, 1910, p. 560
Euprepocnemis ibandana longipennis
 Uvarov, 1921b, p. 114-115, 119 (clé)
Euprepocnemis plorans [= *E. plorans ibandana*]
 Chapman, 1962, p. 60 • Gillon, 1974b, p. 528 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 49, 61
Euprepocnemis ibandana
 Johnston, 1956, p. 388
Euprepocnemis plorans ibandana
 Baccetti, 2004, p. 27 • Chapman, 1961, p. 270 ~ 1962, p. 13, 30-31 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1958b, p. 38, 39-40, 44 ~ 1963b, p. 212 ~ 1964, p. 58 ~ 1966, p. 200-201 ~ 1970, p. 197-201 • Fishpool & Popov, 1984, p. 392 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 141 ~ 1974b, p. 473, 475 • Jago, 1967b, p. 247, 260 ~ 1968, p. 278-279 • Jerath, 1968, p. 27-38 • Johnsen, 1971, p. 31 • Johnston, 1968, p. 208 • Leccoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 551-552 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 179 • Oyidi, 1975b, p. 98 ~ 1976, p. 89, 92 ~ 1977 ~ 1978 • Roy, 2003, p. 337, 380, 387

Certains des spécimens signalés par Dirsh (1963b) sont en fait des *Euprepocnemis dorsalis* (cf. Roy, 1964a, p. 1172)

Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall, 1991 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1958b, 1964, 1966, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • *mat. exam.*) - Guinée (Jago, 1968 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Liberia (Jago, 1968 • Johnsen, 1971) - Mali (Jago, 1968) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1958b, 1964, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Jerath, 1968 • Medler, 1980 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1921b) - Sierra Leone (Dirsh, 1958b, 1964, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Uvarov, 1921b) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Leccoq, 1978b, 1980b)

C'est une sous-espèce d'Afrique sub-saharienne, signalée des régions forestières et préforestières. Elle est également citée du Cameroun, du Sud-Soudan, du Congo, d'Angola, du Zaïre et d'Ouganda.

Selon Dirsh (1958b), cette sous-espèce se distingue de la sous-espèce suivante par l'absence de bande blanche dans l'aire costale des élytres, une taille moyenne plus faible avec des élytres proportionnellement plus courts. Dans les zones nord-soudaniennes, on trouve des individus difficilement rattachables à l'une ou l'autre sous-espèce. C'est par exemple le cas de spécimens du Nord-Ghana et Nord-Togo que nous avons examinés.



⊔ *Euprepocnemis plorans ornatipes* (Walker, 1870)

Cyrtacanthacris ornatipes Walker, 1870a, p. 575

Holotype mâle (femelle selon Uvarov, 1921b), pas de localité, NHM Londres

Syn.: *Heteracris consobrina* Walker, 1870b, p. 673 (clé), 674. Holotype mâle (femelle selon Uvarov, 1921b), sans localité, NHM Londres [Uvarov, 1921b, p. 111, avec *Euprepocnemis plorans*]
 [Dirsh, 1958b, p. 39, avec *Euprepocnemis plorans ornatipes*]
Euprepocnemis plorans var. *senegalensis* I. Bolivar, 1914a, p. 10-11. Type femelle, Sénégal, MNCN Madrid [Dirsh, 1958b, p. 39, avec *Euprepocnemis plorans ornatipes*]
Euprepocnemis plorans pallida Uvarov, 1921b, p. 111-112. Holotype mâle, Soudan, NHM Londres [Dirsh, 1958b, p. 39, avec *Euprepocnemis plorans ornatipes*]

Uvarov (1921b, p. 110, et 1921d, p. 67) avait mis *Cyrtacanthacris ornatipes* en synonymie avec *E. plorans*, puis Dirsh (1958b) lui avait donné un statut de sous-espèce. Harz (1975, p. 371) a de nouveau mis *E. ornatipes* en synonymie avec *E. plorans*. Cette synonymie n'a pas été reprise par les auteurs récents et nous avons maintenu ici ces deux sous-espèces comme distinctes.

Cit.: *Euprepocnemis ornatipes*
 Kirby, 1910, p. 561

Euprepocnemis plorans var. *senegalensis*

Bolívar, 1914a, p. 10-11

Eyprepocnemis plorans

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 (*mat. exam.*)

Eyprepocnemis plorans ornatipes

Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Comes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 100-102 • Descamps, 1965a, p. 951 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1968, p. 549, 550 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 111-112 • Dirsh, 1958b, p. 38 (clé), 39, 42, 44 ~ 1970, p. 197-198 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 337 • Johnston, 1968, p. 209 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 36 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 54-55 ~ 1980b, p. 551-552 ~ 1984 ~ 1988, p. 52-53 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre *et al.*, 2001, p. 315 • Popov, 1989, p. 44-45 • Roy, 1964b, p. 1190 ~ 1965, p. 620 ~ 1969a, p. 212 ~ 1971, p. 404

Eyprepocnemis senegalensis

Davey *et al.*, 1959a, p. 101-102

Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • *mat. exam.*) - "French Sudan" (Dirsh, 1958b, 1970) - Mauritanie (Roy, 1971 • *mat. exam.*) - Mali (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • *mat. exam.*) - Niger (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Dirsh, 1958b • Fishpool & Popov, 1984 • *mat. exam.*) - Nigeria (Comes & Riley, 1972 • Dirsh, 1958b, 1970 • Medler, 1980) - Nord-Cameroun (Dirsh, 1958b, 1970 • *mat. exam.*) - Sénégal (I. Bolívar, 1914a • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1958b, 1970 • Roy, 1964b, 1965, 1969a • *mat. exam.*) - Tchad (Descamps, 1968 • Dirsh, 1958b, 1970 • *mat. exam.*) - AO (Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b, 1988 • Popov, 1989)

Cette sous-espèce est celle qui a été généralement citée pour la zone sahélienne. Elle s'étend vers l'est jusqu'à la Somalie, et, au-delà, au sud-ouest de l'Arabie. Dirsh (1958b) ne la citait qu'au sud du Sahara mais elle est aussi signalée d'Afrique du Nord.

U *Eyprepocnemis plorans plorans* (Charpentier, 1825)

Gryllus plorans Charpentier, 1825, p. 134-135

Type, pas d'information, Lusitania (± Portugal), perdu selon Dirsh (1958b, p. 36). "Néotypes" mâle(s) et femelle(s) désignés par Harz (1975), Espagne, invalides en regard du Code.

Syn.: *Acridium reticulatum* Fischer de Waldheim, 1839, p. 301. Type perdu selon Dirsh (1958b), steppes de la Mer Caspienne.

[Uvarov, 1912, p. 34, avec *Euprepocnemis plorans*]

Calliptamus tarsius Fischer de Waldheim, 1846, p. 241. Type perdu selon Dirsh (1958b), Caucase

[Bey-Bienko & Mistshenko, 1951, p. 268, avec *Euprepocnemis plorans*]

Si la synonymie faite par Harz (1975) est confirmée (voir ci-avant *Eyprepocnemis plorans ornatipes*), *Eyprepocnemis plorans plorans* serait la seule sous-espèce présente dans la zone soudano-sahélienne.

Cit.: *Eyprepocnemis plorans plorans*

Descamps, 1968, p. 549, 550 • Dirsh, 1958b, p. 37, 38, 44 • Johnston, 1968, p. 208 • Medler, 1980, p. 39 • Otte, 1995a, p. 179-180

Dist.: Nigeria (Medler, 1980) - Tchad (Descamps, 1968)

C'est la sous-espèce typiquement paléarctique, signalée de la plupart des pays du pourtour méditerranéen et s'étendant vers l'est jusqu'au Caucase et à l'Iran.

U *Eyprepocnemis plorans ssp.* (Charpentier, 1825) (pas de précision subsppécifique)

Cit.: *Euprepocnemis plorans*

I. Bolívar, 1893c, p. 176 • Descamps, 1953, p. 601, 603, 605, 608 ~ 1954, p. 178, 179 • Golding, 1948, p. 576, 578-584 • Johnston, 1956, p. 390-392 ~ 1968, p. 207-208 • Kirby, 1910, p. 560

Eyprepocnemis plorans

Chopard, 1943c, p. 407-408 ~ 1952, p. 472 • COPR, 1982, p. p. 244-246 • Davey, 1959, p. 127 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Descamps, 1967b, p. 656 • Dirsh, 1956c, p. 277, pl. 40 ~ 1965, p. 285, 286 • Johnsen, 1981a, p. 85 ~ 1981b, p. 153 • Johnston, 1968, p. 207-208 • Karny, 1907, p. 353, 354 ~ 1915, p. 142 • Launois, 1978b, p. 126-127 • Lecoq, 1978b, p. 243, 246 • Le Gall, 1991 • Mallamaire, 1948, p. 632-633 • Mestre, 1988, p. 118-119 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 327 ~ 1971 • Popov, 1985c, p. 45, 50-51 • 1988, p. 15, 36-37, 39 • Risbec & Mallamaire, 1949, p. 73

Pezotettix (Euprepocnemis) plorans

Stål, 1873b, p. 76

Dist.: Bénin (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Burkina Faso (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (I. Bolívar, 1893c • COPR, 1982 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Le Gall, 1991 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Golding, 1948) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988) - Ghana (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Guinée (COPR, 1982 • Karny, 1915 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Liberia (COPR, 1982 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Mauritanie (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Niger (Chopard, 1952 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953, 1954 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Stål, 1873b) - Tchad (COPR, 1982 • Descamps, 1967b • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Chopard, 1943c • Dirsh, 1965 • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b • Mallamaire, 1948 • Popov, 1985c, 1988 • Risbec & Mallamaire, 1949)

Nous n'avons pas cartographié la répartition car elle apporte peu d'informations nouvelles par rapport à la carte précédente.


⊃ ***Eyrepocnemis schulzei* Roy, 1964**

Eyrepocnemis schulzei Roy, 1964a, p.1164-1167, fig. 10-12

Holotype mâle, allotype femelle, Sierra Leone, Mont Bintumane (Monts Loma), MNHN Paris

Cit.: *Eyrepocnemis schulzei*

Jaeger *et al.*, 1966, p. 1183 • Johnston, 1968, p. 209 • Mestre, 1988, p. 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 181 • Roy, 1964a, p. 1155, 1164-1167 ~ 1966, p. 38



Dist.: Sierra Leone (Jaeger *et al.*, 1966 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 1966 • *mat. exam.*)

Cette espèce brachyptère n'est signalée que des monts Loma.

EYREPOCPRIFAS Donskoff, 1983

Eyrepocnemidinae

Eyrepocprifas Donskoff, 1983, p. 345-346

Espèce-type : *Eyrepocprifas insularis* Donskoff, 1983, p. 346

Genre monospécifique, connu jusqu'ici uniquement des îles du Cap-Vert.

⊃ ***Eyrepocprifas insularis* Donskoff, 1983**

Eyrepocprifas insularis Donskoff, 1983, p. 345-348, fig. 1, 2-11

Holotype mâle, Îles du Cap-Vert, San Nicolau, MNHN Paris

Cit.: *Eyrepocprifas insularis*

Donskoff, 1983, p. 345-348 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 212-213 ~ 1984, p. 41-42 • Launois *et al.*, 1988, p. 157 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Otte, 1995a, p. 181

Dist.: Cap-Vert (Donskoff, 1983 • Duranton *et al.*, 1983, 1984 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)

C'est la seule signalisation de cette espèce brachyptère, décrite à partir d'un unique mâle.

FAUREIA Uvarov, 1921

Gomphocerinae

Faureia Uvarov, 1921c, p. 389

Espèce-type : *Faureia rosea* Uvarov, 1921c, p. 391

Syn.: *Ugandella* Sjöstedt, 1923a, p. 18 [Uvarov, 1934c, p. 605, avec *Faureia*]

Genre afrotropical comprenant trois espèces en incluant *F. vittigera* (Karsch), espèce à l'origine décrite dans le genre *Pnorisa*.

⊃ ***Faureia milanjica* (Karsch, 1896)**

Rhaphotittha milanjica Karsch, 1896, p. 258-259

Holotype femelle, territorium Nyassa (= Malawi), Milanji (= Milange, Mozambique), MNHU Berlin (DORSA : holotype)

L'holotype porte l'étiquette suivante : "Synonym mit *Pnorisa vittigera* Karsch und gehört zu *Faureia* Uv., Det. B. Uvarov 1925". Cette synonymie n'a jamais été publiée. Si elle était exacte, *F. vittigera*, qui a priorité, serait la seule présente en Afrique de l'Ouest (voir ci-après).

Syn.: *Faureia rosea* Uvarov, 1921c, p. 391-392. Holotype mâle, Afrique du Sud, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 501, avec *Faureia milanjica*]

Ugandella subparallela Sjöstedt, 1923a, p. 20 (non *Chortoicetes subparallelus* Rehn). Syntypes mâles, femelles, Uganda et Zaïre, dépositaire ?

[Uvarov, 1953b, p. 172, avec *Faureia milanjica*]

Faureia milanjica var. *coerulescens* Miller, 1929, p. 71. Syntypes mâles, femelles, Tanzanie, NHM Londres

[Dirsh, 1966, p. 501, avec *Faureia milanjica*]

Rhaphotittha flavipennis Sjöstedt, 1929a, p. 6-8, 40. Type mâle, Zaïre, NM Vienne

[Hollis, 1966, p. 327, avec *Faureia milanjica*]