

1962, 1969b) - **Gambie** (Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Uvarov, 1926a) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Golding, 1948 • Kamy, 1907 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Roy, 1962, 1964a) - **Guinée-Bissau** (Jago, 1968) - **Liberia** (Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Roy, 1962) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Phipps, 1971) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984) - **Nigeria** (Comes & Riley, 1972 • Golding, 1946, 1947, 1948 • Jago, 1968 • Jerath, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988) - **Sénégal** (Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1965, 1967, 1968, 1969a, 1970) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Roy, 1964a) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kamy, 1907 • Ramme, 1931a) - **AO** (Dirsh, 1965, 1966 • Jago, 1964a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Roy, 1968)

OXYOLENA Karsch, 1893

Acridinae


Oxyolena Karsch, 1893, p. 52 (clé), 58
Espèce-type : *Oxyolena mucronata* Karsch, 1893, p. 58

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Oxyolena mucronata*** Karsch, 1893

Oxyolena mucronata Karsch, 1893, p. 57, 58-59, fig. 2 (p. 57)
Syntypes femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 1 syntype femelle et 1 spécimen non typique)

Cit.: *Oxyolena mucronata*
Dirsh, 1958c, p. 61-62 ~ 1965, p. 414, 415 • Jago, 1967b, p. 251 ~ 1968, p. 328 • Johnston, 1956, p. 649 • Karsch, 1893, p. 57-59 • 1965, p. 414-415 • Kirby, 1910, p. 98 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Otte, 1995b, p. 294



Dist.: **Togo** (Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Le matériel-type et le spécimen indiqué par le projet DORSA (même localité) sont les seules signalisations de cette espèce.

PAMPHAGULUS Uvarov, 1929

Dericorythinae

Pamphagulus Uvarov, 1929a, p. 99
Espèce-type : *Pamphagulus bodenheimeri* Uvarov, 1929

Ce genre englobe six espèces xérophiles ou franchement désertiques d'Afrique au nord du Sahara. L'extension de certains représentants vers la zone sub-saharienne, via le Sahara occidental, reste à préciser.

⊃ ***Pamphagulus uvarovi uvarovi*** Ramme, 1931

Pamphagulus uvarovi Ramme, 1931b, p. 193-194, fig. 11a, pl. 1 : f. 8
Holotype femelle, Mauritanie occidentale, Cap-Blanc à St-Louis, MNHN Paris

Cit.: *Pamphagulus uvarovi*
Chopard, 1943c, p. 385 ~ 1952, p. 469 • Dirsh, 1965, p. 184, 185 • Johnston, 1956, p. 204 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Ramme, 1931b, p. 193
Pamphagulus uvarovi uvarovi
Otte, 1995a, p. 74

Dist.: **Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1931b)

Hormis les signalisations de Mauritanie, cette espèce n'est citée que du Sahara occidental.