

**STAURACLEIS** Uvarov, 1923

Catantopinae

*Staurocleis* Uvarov, 1923c, p. 682

Espèce-type : *Staurocleis magnifica* Uvarov, 1923c, p. 682

Genre afrotropical monospécifique.

⊔ ***Staurocleis magnifica*** Uvarov, 1923

*Staurocleis magnifica* Uvarov, 1923c, p. 682-684

Holotype mâle, Ouganda, Entebbe, NHM Londres

**Syn.:** *Staurocleis magnifica occidentalis* Uvarov, 1923c, p. 684. Holotype mâle, Ghana, NHM Londres  
[Dirsh, 1970, p. 262, avec *Staurocleis magnifica*]

*Staurocleis occidentalis* Sjöstedt, 1931a, p. 52-53 (nom. preoc). Syntypes mâles, femelle, Burkina Faso, NR Stockholm  
[Dirsh, 1956a, p. 17, avec *Staurocleis magnifica occidentalis*]

**Cit.:** *Staurocleis magnifica*

COPR, 1982, p. 268-269 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Dirsh, 1956c, p. 275, pl. 34 ~ 1964, p. 59 ~ 1965, p. 346, 347 ~ 1970, p. 262-263 • Fishpool & Popov, 1984, p. 342 • Gillon, 1974b, p. 480-481 ~ 1983, p. 296 • Jago, 1984, p. 357-358 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 53 • Lecoq, 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 51, 61 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 156-157 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Otte, 1995a, p. 339 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 52-53 • Roy, 2003, p. 343, 380, 387

*Staurocleis magnifica occidentalis*

Chapman, 1962, p. 29 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey *et al.*, 1959a, p. 93 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 953, 958 • Dirsh, 1956, p. 17 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Gillon, 1974a, p. 144 • Golding, 1948, p. 571 • Jago, 1967b, p. 260 ~ 1968, p. 268 • Johnston, 1956, p. 344 ~ 1968, p. 243 • Launois, 1978b, p. 154-155 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1980a, p. 59 ~ 1980b, p. 555-556 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 42 • Uvarov, 1923c, p. 684

*Staurocleis occidentalis*

Sjöstedt, 1931b, p. 52



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1956, 1964, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b • Uvarov, 1923b • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Gillon, 1974a,b • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Uvarov, 1923c • *mat. exam.*) - Guinée (Roy, 2003) - Mali (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1923c) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Gillon, 1983 • Jago, 1984 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989)

Cette espèce, à la coloration très caractéristique, est également signalée du Cameroun, du Zaïre et d'Ouganda. Elle est donc logiquement présente dans divers autres pays d'Afrique centrale (Centrafrique, Congo...).

**STENOCROBYLUS** Gerstäcker, 1869

Catantopinae

*Stenocrobilus* Gerstäcker, 1869, p. 219

Espèce-type : *Stenocrobilus cervinus* Gerstäcker, 1869, p. 220

Genre afrotropical comprenant une douzaine d'espèces.

⊔ ***Stenocrobilus cinnabarinus*** Ramme, 1929

*Stenocrobilus cinnabarinus* Ramme, 1929, p. 452, pl. 14 : f. 3

Holotype femelle, Centrafrique, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : + 2 paratypes femelles)


**Cit.:** *Stenocrobylus cinnabarinus*

Descamps, 1965a, p. 953, 958-959 • Dirsh, 1965, p. 322, 323 • Jago, 1984, p. 366 • Johnston, 1956, p. 345 ~ 1968, p. 229 • Lecoq, 1980b, p. 555-556 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 57-58, 61 • Mestre, 1988, p. 138-139 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 250 • Ramme, 1929, p. 452, pl. 14 • Roy, 1967, p. 1559-1560

? *Stenocrobylus* sp.

Jago, 1967b, p. 261 ~ 1968, p. 270

La description de cette espèce indéterminée, faite par Jago (1967b), espèce différente de *S. festivus* (citée aussi par cet auteur), est tout à fait conforme à *S. cinnabarinus* et nous y rapportons donc ces signalisations.



**Dist.:** Côte d'Ivoire (Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968) - Guinée (*mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1967 • *mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - AO (Lecoq, 1980b)

Hormis notre zone, l'espèce n'est signalée que par la localité-type de Centrafrique.

U *Stenocrobylus festivus* Karsch, 1891

*Stenocrobylus festivus* Karsch, 1891, p. 190-191

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station et Kribi, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes Barombi-Stat.)

**Syn.:** *Stenocrobylus ornatus* Giglio-Tos, 1907b, p. 25. Syntypes mâles, femelles, Congo et Zaïre, MRSN Turin

[Uvarov, 1953b, p. 42, avec *Stenocrobylus festivus ornatus*]

[Dirsh, 1956a, p. 144, avec *Stenocrobylus festivus*]

*Stenocrobylus festivus magnicercus* Uvarov, 1953b, p. 43-44. Holotype mâle, Angola, NHM Londres

[Dirsh, 1956a, p. 144, avec *Stenocrobylus festivus*]

**Cit.:** *Stenocrobylus festivus*


Baccetti, 2004, p. 28 • I. Bolívar, 1893b, p. 176 • Chopard, 1958a, p. 138 • COPR, 1982, p. 267-268 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Dirsh, 1963b, p. 214 ~ 1965, p. 322, 323 ~ 1970, p. 231-233 • Fishpool & Popov, 1984, p. 394 • Gillon, 1974a, p. 144 ~ 1974b, p. 479-480, 520-521, 528 • Golding, 1937, p. 9 ~ 1940b, p. 130 ~ 1946, p. 23, 34 ~ 1948, p. 571, 578-584 • Jago, 1968, p. 269-270 ~ 1984, p. 366 • Johnston, 1956, p. 346 ~ 1968, p. 229 • Karsch, 1893, p. 102 • Kirby, 1910, p. 485 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 555 • Le Gall, 1989 ~ 1991 ~ 1997 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 57-58, 61 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 138-139 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 318 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 328-329 ~ 1971, p. 71-97 • Ramme, 1929, p. 452, 453, 482, 484 • Roy, 2003, p. 341, 380, 387

*Stenocrobylus festivus festivus*

Chapman, 1962, p. 29 • Descamps, 1965a, p. 953, 960 • Dirsh, 1966, p. 217-218 • Jago, 1967b, p. 260 • Johnsen, 1970, p. 138, 140 • Johnston, 1956, p. 346 • Otte, 1995a, p. 251 • Uvarov, 1953b, p. 42-44

*Stenocrobylus ornatus*

Ramme, 1929, p. 449, 483



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001) - Côte d'Ivoire (Baccetti, 2004 • I. Bolívar, 1893b • COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Jago, 1968 • Le Gall, 1989, 1991, 1997 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Phipps, 1971 • *mat. exam.*) - Guinée (Chopard, 1958a • COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • *mat. exam.*) - Liberia (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Mali (COPR, 1982 • Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1937, 1940b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1953b) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Dirsh,

1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)

L'aire de répartition s'étend vers l'est jusqu'à l'Éthiopie et, vers le sud, jusqu'à l'Angola et au Zimbabwe.

## STENOHIPPIUS Uvarov, 1926

Gomphocerinae

*Stenohippus* Uvarov, 1926a, p. 423-425

Espèce-type : *Chorthippus (Stauroderus) xanthus* Karny, 1907, p. 363-364

Ce genre difficile a été révisé par Jago (1996a). Il est représenté de l'Afrique à l'Inde par neuf espèces dont six présentes en Afrique. Jago (1971, p. 226) avait mis ce genre en synonymie avec *Leva* l. Bolívar, 1909, mais ceci n'a pas généralement pas été suivi par la suite, et cet auteur est revenu sur cette synonymie dans son dernier travail.

Compte tenu de la grande confusion qui a régné dans ce genre, les déterminations antérieures à la révision de Jago sont très problématiques. Nous n'avons donc retenu pour la cartographie que les données de ce travail et le matériel que nous avons examiné.

### ⊔ *Stenohippus aequus* Uvarov, 1926

*Stenohippus aequus* Uvarov, 1926a, p. 426-427, pl. 47 : f. 8


Holotype mâle, Nord-Nigeria, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

**Cit.:** *Leva aequa* (- us)

Johnsen, 1981a, p. 96 • Medler, 1980, p. 40

*Stenohippus aequus*

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 334-335 • Davey *et al.*, 1959b, p. 588-589 • Descamps, 1965b, p. 1292 • Dirsh, 1965, p. 533-534 • Fishpool & Popov, 1984, p. 378 • Golding, 1948, p. 537 • Jago, 1968, p. 340 ~ 1996a, p. 82, 84, 87, 115-116 • Johnston, 1956, p. 687 ~ 1968, p. 380 • Mestre, 1988, p. 276 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Mestre *et al.*, 2001, p. 326 • Uvarov, 1926a, p. 427



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Burkina Faso (Jago, 1996a) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Jago, 1996a) - Mali (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Jago, 1996a) - Niger (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1996a • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1926a) - Sénégal (Jago, 1996a) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1996a • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

Ne sont cartographiées que les localités issues de la révision de Jago et le matériel que nous avons examiné. Hors de notre zone d'étude, l'espèce n'est signalée que du Soudan.

### ⊔ *Stenohippus mundus* (Walker, 1871)

*Stenobothrus mundus* Walker, 1871, p. 79-80

Holotype femelle (*indiqué mâle par Walker*), Inde, Bombay, NHM Londres

**Syn.:** *Stenobothrus epacromioides* Walker, 1871, p. 81. Holotype femelle, Inde, NHM Londres

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

*Stenobothrus epacromioides* Krauss, 1877, p. 144, nom. praeoc. Holotype femelle, Sénégal, NM Vienne

[l. Bolívar, 1918b, p. 380, avec *Stauroderus bonneti*, nom. subst.]

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

*Stenobothrus bonneti* l. Bolívar, 1885, p. 116. Syntypes mâle(s), femelle(s) (holotype mâle, Jago, 1996a), Tunisie, MNHN Paris

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

*Stenobothrus epacromioides* var. *nigrovittata* Krauss, 1892, p. 166. Lectotype mâle (Jago, 1996a), Îles Canaries, NM Vienne

[l. Bolívar, 1918b, p. 380, avec *Stauroderus bonneti*]

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]

*Stenobothrus bonneti orientalis* Uvarov, 1933b, p. 666-667. Holotype mâle, Israël, NHM Londres

[Jago, 1996a, p. 118, avec *Stenohippus mundus*]