



La signalisation de Gambie (Mestre & Chiffaud, 1997) est une erreur. L'espèce est également signalée du Soudan.

**SUMBA** I. Bolívar, 1909

Acridinae

*Sumba* I. Bolívar, 1909b, p. 288-289

Espèce-type : *Sumba roseipennis* I. Bolívar, 1912b (1911), p. 78

Genre afrotropical comprenant six espèces.

⊍ *Sumba longicornis* Ramme, 1929

*Sumba longicornis* Ramme, 1929, p. 275, pl. 3 : f. 25-26

Holotype mâle, Centrafrique, Bosum, MNHU Berlin (DORSA : + 11 paratypes)

Cit.: *Sumba longicornis*

Dirsh, 1965, p. 422, 423 • Fishpool & Popov, 1984, p. 400 • Johnston, 1956, p. 616 • Jago, 1968, p. 314-315 • Johnsen, 1971, p. 40-42 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119, 124 • Otte, 1995b, p. 305 • Ramme, 1929, p. 257

*Sumba* sp. (identification sous réserve de la bonne affectation générique, *S. longicornis* étant la seule espèce ouest-africaine)  
Delarze & Le Gall, 1989, p. 279, 280



Dist.: ? Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Cette espèce est aussi signalée de Centrafrique.

**TAIACRIS** Donskoff, 1986

Catantopinae

*Taiacris* Donskoff, 1986, p. 206-207

Espèce-type : *Taiacris couturieri* Donskoff, 1986, p. 207-209

Genre afrotropical monospécifique.

⊍ *Taiacris couturieri* Donskoff, 1986


*Taiacris couturieri* Donskoff, 1986, p. 207-209, fig. 17-33

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Forêt de Taï, MNHN Paris

Cit.: *Taiacris couturieri*

Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Donskoff, 1986, p. 207-209, fig. 17-33 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118

Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Donskoff, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997)



Le matériel-type est pour l'instant le seul signalé pour cette espèce forestière.

## TANITA I. Bolívar, 1904

Pyrgomorphinae

*Tanita* I. Bolívar, 1904, p. 446

Espèce-type : *Pyrgomorpha breviceps* I. Bolívar, 1882, p. 109 [Kirby, 1910, p. 323]

Syn.: *Protagasta* I. Bolívar, 1908c, p. 91-92 [Kevan, 1962c, p. 135, avec *Tanita*]

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces.

### ⊂ *Tanita parva violacea* Kevan, 1962

*Tanita parva violacea* Kevan, 1962c, p. 150, fig. 38-39 (p. 149)

Holotype femelle, allotype mâle, Nord-Ouganda, Lira (Torit rd.), NHM Londres

**Cit.:** *Tanita breviceps*

Gillon, 1971 ~ 1974a, p. 131-132, 169-170 ~ 1974b, p. 458, 521, 523

*Tanita parva*

Delarze & Le Gall, 1989, p. 277, 279 • Descamps, 1965a, p. 937-938, *subsp.* ? • Dirsh, 1965, p. 140 • Duviard, 1970a, p.69

• Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1983, p. 301 • Johnston, 1968, p. 120 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 535, 538 • Le Gall &

Mestre, 1986, p. 46, 57-58, 60 • Roy, 1969a, p. 196-207, 209, 221-232

*Tanita parva violacea*

Cornes & Riley, 1972, p. 6 • Fishpool & Popov, 1984, p. 387 • Jago, 1967b, p. 243 ~ 1968, p. 229 • Kevan, 1977, p. 441 •

Medler, 1980, p.36 • Mestre, 1988, p. 56-57 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Mestre *et al.*, 2001, p. 311 • Otte, 1994b, p.

125



**Dist.:** Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Duviard, 1970a • Gillon, 1971, 1974a,b, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1968 • Medler, 1980) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - Togo (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - AO (Kevan, 1977 • Lecoq, 1978b, 1980b)

Curieusement, hormis les types d'Afrique de l'Est, ce sont les seules signalisations de cette sous-espèce.

## TAPHRONOTA Stål, 1873

Pyrgomorphinae

*Taphronota* Stål, 1873a, p. 51

Espèce-type : *Poecilocerus porosus* Stål, 1855, p. 352 [= *Taphronota calliparea* (Schaum)]

Syn.: *Epamontor* Kirby, 1902a, p. 87 [I. Bolívar, 1904a, p. 396, avec *Taphronota*]

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 213, avec *T. (Epamontor)*]

*Pyrgophyma* Giglio-Tos, 1907a, p. 2 [I. Bolívar, 1909a, p. 15, avec *Taphronota*]

[Kevan, Akbar & Chang, 1974, p. 213, avec *T. (Taphronota)*]

Ce genre afrotropical a été longtemps confus et de nombreuses espèces ont été signalées en Afrique de l'Ouest.