

*Acanthacris* Uvarov, 1923a, p. 144

Espèce-type : *Gryllus ruficornis* Fabricius, 1787

Ce genre a été révisé par Mungai (1987a) qui reconnaît quatre espèces. Trois d'entre elles sont strictement sub-sahariennes mais la quatrième, *Acanthacris ruficornis*, a une répartition qui s'étend aussi à l'Afrique du Nord et à l'Arabie.

On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations concernant *Acanthacris ruficornis* (Fabricius), seule autre espèce présente en Afrique de l'Ouest, avec deux sous-espèces : *A. ruficornis ruficornis* et *A. ruficornis citrina*. Ces deux sous-espèces ont été signalées du Cameroun.

**Clé spécifique** : Mungai (1987a).

### ***Acanthacris elgonensis* Sjöstedt, 1932**

*Acanthacris ruficornis elgonensis* Sjöstedt, 1932, p. 38, 67.

Syntypes mâles, femelles, Ouganda, Mt. Elgon, NR Stockholm. Lectotype mâle désigné par Mungai (1987, p. 815).

#### **Citations bibliographiques**

*Acanthacris elgonensis*

- Mungai, 1987a (stat. nov.), p. 810, 812, 814, 815-816, 818, 820, figs. 1, 2, 8, 14, 22, 30, 33


- Otte, 1995b, p. 1

*Acanthacris ruficornis elgonensis*

- Dirsh, 1966, p. 344

- Johnston, 1956, p. 374

- Sjöstedt, 1932, p. 38, 67



#### **Distribution géographique**

**Cameroun** (Mungai, 1987a)

L'espèce est également signalée d'Ouganda et du Kenya.

#### **Iconographie**

**Habitus** (im. ♂ : Mungai, 1987a) - **Autres morph.** (Mungai, 1987a) - **Anat.** (génit. ♂ : Mungai, 1987a)

#### **Bio-écologie**

Aucune information.